

33 456
Zur operativen Behandlung
der Myome
der Gebärmutter in der Schwangerschaft
und Geburt.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie,

welche

mit Genehmigung der hohen medicinischen Fakultät

der

vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

zugleich mit den Thesen

Sonnabend, den 9. Februar 1895, Mittags 12 Uhr

öffentlich verteidigen wird

Franz Sali Kirchheimer

aus Heilbronn (Württemberg).

Referent: Herr Prof. Dr. Fehling.

Opponenten:

Herr Curt Stünzner, cand. med.

Herr Ernst Ziegler, cand. med.



Halle a. S.

Hofbuchdruckerei von C. A. Kaemmerer & Co.
1895.

Imprimatur
Prof. Dr. **Bernstein**,
h. t. Decanus.

Seiner lieben Schwester,
Frau Kantonalarzt Dr. Louis
zu Herlingen in Lothringen

gewidmet

vom Verfasser.





Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Fälle zeitlichen Zusammenfallens einer Schwangerschaft mit einem Myom der Gebärmutter sind nicht gerade häufig. Diese Geschwülste erschweren theils aus mechanischen Gründen (Unmöglichkeit des Zusammentreffens von Sperma und Ei infolge der Grösse oder des Sitzes eines Myoms) theils aus dynamischen, d. h. infolge der von dem Myom gesetzten Veränderungen (vorwiegend consecutive Entzündungsprozesse der Gebärmutter, wodurch die Bedingungen für das Haften und die Weiterentwicklung des Eies höchst ungünstige werden) das Zustandekommen einer Conception. Es leuchtet ein, dass die submucösen Uterusmyome zur Empfängnis viel weniger disponieren als die interstitiellen oder gar die subserösen. In Bezug auf erstere äusserte sich Louis¹⁾ wie folgt: „Unfruchtbarkeit ist die notwendige Folge der Anwesenheit von fremden Körpern in der Gebärmutterhöhle“. Diese Ansicht war lange Zeit die herrschende, bis sie durch die Autorität Levret's erschüttert wurde, und sicher verbürgte Beobachtungen von Empfängnis bei submucösen Uterusmyomen vorlagen. Röhrig²⁾ weiss unter 147 Fällen von Empfängnis bei Myom der Gebärmutter,

1) Mém. de l'Acad. de chir. T. II, p. 137.

2) Zeitsch. f. Geb. und Gyn. V. 1880.

die er beobachtet hat, kein einziges Beispiel von Schwangerschaft bei submucösen Myomen, ja er giebt die Möglichkeit einer solchen kaum für die interstitiellen zu. Im Gegensatz hierzu wies Schorler¹⁾ an der Hand einer grösseren Statistik nach, dass die subserösen Myome am häufigsten Unfruchtbarkeit bedingen. Als Grund dafür giebt er die sehr oft bei diesen Geschwülsten eintretenden partiellen Peritonitiden an, und in ihrem Gefolge Schwartenbildung um die Eierstöcke, Verschluss und Obliteration der Muttertrompeten, was „um so mehr in's Gewicht falle, als gerade die subserösen Tumoren häufiger als die übrigen Formen multipel zu beiden Seiten des Uterus auftreten“. Diese Verwachsung und Verschliessung der Muttertrompeten kommt, wie es mir scheint, öfters auf anderem Wege zustande, nämlich dadurch, dass die Blenorrhöe der Gebärmutter-schleimhaut sich allmählich bis dahin ausbreitet (Lehmann²⁾). Kommt es bei intrauterinen Myomen wirklich zu einer Empfängnis, so muss nach Horwitz³⁾ letztere zu einer Zeit eingetreten sein, wo die Geschwulst noch in der ersten Periode der Entwicklung stand, so dass also durch sie noch keine Veränderungen der Gebärmutter herbeigeführt worden sind. Dabei ist natürlich vorausgesetzt, dass die Geschwulst nicht allzugross ist, dass sie so gelagert und befestigt ist, dass sie dem eindringenden Samen kein mechanisches Hinderniss entgegengesetzt, also ihren Ursprung von einer Muttermundslippe oder oberhalb des inneren Muttermunds nimmt, und, falls sie aus dem Cervical-Kanal herauskommt, einen mehr oder weniger langen Stil hat und in die Scheide ragt, ohne dabei den Muttermund zu verschliessen. Gusserow⁴⁾ nimmt in 27⁰/₀, Engelmann⁵⁾ in

1) Zeitschr. f. Geb. und Gyn. XI. 1885.

2) Tijdschr. tot bevording d. Geneskunst. Maart en April 1854.

3) St. Petersburg. med. Zeitschr. XIV. Bd. 1868.

4) Neubild des Uter. Enke, Stuttg. 1835.

5) Zeitschr. f. Geb. und Gyn. I. 1877.

26⁰/₀ und Schorler¹⁾ in 33,77⁰/₀ Sterilität an. C. Mayer²⁾,
der 152 Fälle von Myomkranken gesammelt hat, fand
15,7⁰/₀ ledig und kinderlos;
84,1⁰/₀ verheiratet,
davon 14,8⁰/₀ steril.

Trotz der grössten Veränderungen der Gebärmutter durch die Myome tritt bisweilen dennoch Conception ein. Rosthorn³⁾ hebt in zwei Fällen von Coincidenz von Schwangerschaft mit Myom der Gebärmutter das Wunderbare des Eintritts der Empfängniss trotz bestehender secundärer Endometritis hervor.

Eine rechtzeitige Geburt bei Myom der Gebärmutter bekommen wir noch seltener zu sehen, da einerseits häufig die Schwangerschaft durch Myome der Gebärmutter spontan unterbrochen wird, andrerseits die Schwangerschaft öfters von Störungen der mannigfachsten Art begleitet ist (Blutungen, Compressionerscheinungen infolge des doppelten Wachstums der Gebärmutter und der Geschwulst unter dem Einflusse der Schwangerschaft), die nur gar zu oft einen das Leben bedrohenden Charakter annehmen, so dass eine Operation zur Beseitigung der Schwangerschaft (künstliche Frühgeburt) oder des Myoms (Myomotomie; aber oft mit spont. Abort in Gefolge) oder beider Zustände (Amputatio uteri supravaginalis) nötig wird. Was den spont. Abort (bezw. Frühgeburt) bei Myomen der Gebärmutter anlangt, so hat diesen Hofmeier⁴⁾ unter 36 Fällen 6 mal beobachtet — 2 Fälle abgerechnet, wo in einem Fall eine Blasenmole vorhanden war und wo es sich im andern Fall um ein vorher schon abgestorbenes Kind handelte — das wären 12⁰/₀ Aborte, während nach Hegar bei unkomplizierter Schwangerschaft der Prozentsatz der vorzeitigen Unter-

1) l. c.

2) D. i. Zürich 1887.

3) Prag. med. Woch. 1892 No. 9. Sitzungsber.

4) Würzb. Physik. med. Gesellsch. 1893. IV. Sitzung vom 18./3. 1893.

brechung 10% ist. Röhrig¹⁾ hat unter 147 Fällen von Empfängnis 129 Aborte beobachtet! Stratz²⁾ erwähnt unter 11 Fällen 4 mal spontane Unterbrechung, ebenso C. Mayer³⁾; Busse⁴⁾ teilt unter 5 Fällen der Gusserow'schen Klinik einen Fall von spont. Frühgeburt mit.

Ob Korpussyome eher Abort, Collummyome eher Frühgeburt bedingen (Johnston⁵⁾), lassen wir dahin gestellt. Von Einfluss auf eine Unterbrechung der Schwangerschaft scheint der Sitz der Geschwulst zu sein. Die im unteren Gebärmutterabschnitt sitzenden Myome, besonders die submucösen scheinen am häufigsten den Anlass zu geben. Auch die Grösse der Cervicalmyome wird dabei eine Rolle spielen. Nach C. West⁶⁾ werden die submucösen Cervicalmyome deshalb eine der häufigsten Ursachen des Aborts, weil sie es sind, die die anhaltendsten und profusesten Blutungen im Gefolge haben. Weitere Ursachen des Aborts ausser diesen Blutungen können abgeben: Die Veränderungen in der Lage der Gebärmutter, die Einkeilung der Myome im Becken, Peritonitiden infolge von cystösen Myomen oder Stieldrehung, der Tumor an und für sich oder dessen Einfluss auf die Gebärmutterwandung. Infolge davon, dass letztere mit Geschwulstmassen durchsetzt ist, wird sie sich bei fortschreitendem Wachstum des Eies nicht gehörig ausdehnen können. Dies kann auch infolge eines mechanischen Hindernisses von seiten eines grossen, gestielt der Gebärmutter aufsitzenden Myoms eintreten. Man kann sich denken, dass die Schwangerschaft wohl ihr normales Ende erreichen kann, wenn das Wachstum z. B. eines intrauterinen Polypen nur allmählich, d. h. gleichmässig mit der Vergrösserung der Gebärmutter erfolgt, dass es hingegen zum

1) l. c.

2) Zeitschr. f. Geb. und Gyn. XII. Bd. 1886.

3) l. c.

4) D. i. Berlin 1886.

5) cfr. Sutugin, Wratsch. 1892. No. 1.

6) cfr. Horwitz, l. c. S. 252.

Abort kommen muss, weil die normale Entwicklung der Gebärmutter gehemmt ist, wenn das Wachstum des Polypen ein rascheres ist als das der schwangeren Gebärmutter.

Der Güte des Herrn Professor Fehling habe ich es zu verdanken, dass ich 3 Fälle dieser seltenen Complication der Oeffentlichkeit übergeben kann, die derselbe während seiner Basler Thätigkeit zu operiren die Gelegenheit hatte. In 2 Fällen handelte es sich um je einem operativen Eingriff in der Schwangerschaft, und zwar um je eine Amputatio uteri supravaginalis; in dem 3. Falle um die Ausführung des Kaiserschnitts nach Porro in partu. Sämmtliche Operierte genasen. Leider war das durch den Porro entbundene Kind intrauterin abgestorben.

Im Anschluss an die Schilderung dieser 3 Fälle habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, in der Litteratur die Fälle von Complication von Schwangerschaft und Geburt mit Myomen der Gebärmutter zusammenzusuchen, die Anlass gegeben haben zu folgenden operativen Eingriffen:

I. Kolpomyomotomien (nach Fritsch = alle Manipulationen von der Scheide aus zur Entfernung von Myomen der Gebärmutter).

a. In graviditate.

b. In partu.

(c. Post partum.

d. In puerperio.)

II. Myomotomieen ohne Eröffnung der Uterushöhle (im Sinne Fehlings, Lehrb. d. Frauenkr., 1893. S. 327).

III. Amputationes uteri supravaginales.

IV. Sectiones caesareae.

A. Nach Saenger.

(Fortführung der Saengerschen Statistik vom Jahre 1882 ab; cfr. Festschrift zum Jubiläum Credé's: Sänger, „Der Kaiserschnitt bei Uterusfibromen“).

B. Nach Porro.

Ich beginne mit der Beschreibung der Krankengeschichten.

Krankengeschichte I.

Anamnese: Frau L. G. aus Schopfheim (Baden), 35 Jahre alt, verheiratet, menstruiert seit dem 14. Lebensjahre, regelmässig, dreiwöchentlich 4–5 Tage lang, schwach und bisweilen mit Molimina am 1. Tage, hat noch nie geboren.

Am 22. Januar 1890 trat P. auf die Abteilung wegen Schmerzen im Rücken und im Unterleib: Es bestand häufiger Drang zum Wasserlassen, mit brennenden Schmerzen dabei. Weisses Fluss war nie vorhanden. Ausserdem litt P. an hartnäckiger Verstopfung. Seit 24. August 1889 ist die Regel nicht wieder eingetreten. Seither soll der Leib ziemlich schnell an Umfang zugenommen haben. Die Gebärmutter zeigte sich damals vergrössert und reichte bis zur Mitte zwischen Nabel und Symphyse. Die Portio war tief im Becken, der vorderen Beckenwand genähert; hinter derselben, das hintere Scheidengewölbe herabdrängend, eine Kindskopfgrosse Geschwulst, fest mit der hinteren Wand der Gebärmutter zusammenhängend, unbeweglich im kleinen Becken. Es wurde damals die Diagnose auf ein Fibromyoma uteri subserosum retrocervicale in graviditate (mens. V) gestellt. Es wurde vergebens versucht, die Geschwulst von der Scheide aus in Narcose in die Höhe zu schieben. Die angestellte Beckenmessung ergab folgendes: Spin. il. $23\frac{1}{2}$, Crist. il. $29\frac{3}{4}$, Troch. $29\frac{3}{4}$, Conj. ext. $19\frac{1}{2}$ und Conj. diagon. (bis zu der Geschwulst) 5 cm. Die Brustdrüsen waren gut entwickelt und hatten eine fassbare Warze.

Da die Möglichkeit vorlag, dass die Geschwulst mit dem fortschreitenden Wachstum der Gebärmutter infolge der bestehenden Schwangerschaft in die Höhe rücken würde, so wurde vorläufig beschlossen abzuwarten, möglicherweise für später der Kaiserschnitt in Aussicht genommen. Am 3. Februar 1890 verliess Patientin wieder die Abteilung.

Status praesens: Am 19. Mai trat Patient zur Beobachtung wieder in die Anstalt ein. Die ersten Wehen begannen am 1. Juni 1890 morgens 4 Uhr. Das Kind befand

sich in II. Steisslage, mit dem Rücken nach hinten. Herr Professor Fehling entschloss sich den Kaiserschnitt zu machen. Die Anzeige zu dieser Operation war eine absolute: es bestand eine hochgradige Verengung des Beckens durch eineingekeiltes retrouterin gelegenes Myom der Gebärmutter. Die Herztöne des Kindes, abends noch deutlich, wurden vor Beginn der Operation nicht mehr gehört.

Beschreibung der Operation:

Am 2. Juni morgens 8 Uhr wird zunächst die Chloroformnarcose eingeleitet. Nach gründlicher Säuberung der Bauchdecken mit warmem Wasser und Seife, sowie noch Desinfektion derselben mittelst Alcohol und $\frac{1}{100}$ Sublimatlösung wird ein medianer Längsschnitt gemacht, 2 Querfinger über den Nabel beginnend und bis 2 Querfinger oberhalb der Symphyse sich erstreckend. Die Musculi recti sind nur im untern Teil des Schnittes sichtbar. Nun wird das Bauchfell gespalten, worauf die Gebärmutter zum Vorschein kommt. Es werden einige Unterbindungen in den Bauchdecken gemacht. Hierauf wird der Schnitt nach oben noch um 2 Querfinger verlängert, um die Gebärmutter herauswälzen zu können, was auch ohne grosse Mühe gelingt. Während die Gebärmutter sorgfältig aus der Bauchhöhle herausgehoben wird, folgt dem Zug mit mässiger Schwierigkeit die subseröse, breit der Gebärmutter aufsitzende, das kleine Becken einnehmende, 2 faustgrosse Geschwulst. Hierauf wird um den Cervix uteri ein elastischer Schlauch gelegt, und letzterer mit einer Klemme befestigt. Es folgt ein medianer Längsschnitt auf der Gebärmutter, vom Grund derselben aus, etwa 25 cm. lang, nachdem vorher Schwämme in die Bauchhöhle eingeführt waren, um die Gebärmutter zurückzuhalten. Die Bauchhöhle wird mit Mullcompressen geschützt. Das Kind wird entwickelt, um 8 Uhr und 40 Minuten (bis zu dieser Zeit hatte die Geburt 28 Stunden und 40 Minuten gedauert). Vorher war die Nabelschnur jedoch zwischen 2 Klemmen durchschnitten worden. Das Kind befindet sich in II. Steisslage, was schon

früher durch die Untersuchung festgestellt war, und ist abgestorben. Der Mutterkuchen sitzt oben und hinten, etwas rechts. In der Hoffnung den Mechanismus seiner Loslösung verfolgen zu können, wird der Mutterkuchen unberührt gelassen. Inzwischen wird über der provisorischen Ligatur die endgültige angelegt. Der elastische Schlauch hat aber die Serosa des Scheitels der Blase mitgefasst, was durch Katheterisation erkannt wird. Deshalb wird eine neue elastische Ligatur oberhalb der anderen angelegt, welche losgelöst wird. Dabei fällt aber plötzlich der gelöste Mutterkuchen heraus. Nun wird die Gebärmutter mitsamt der ihr anhaftenden Geschwulst abgetragen. Das parietale Blatt des Bauchfells wird mit dem Bauchfell unterhalb der elastischen Ligatur vorn mit nur einer Seidennaht verbunden, seitlich mit je 2 und hinten mit ebenfalls 2 Seidennähten. Hierauf erfolgt die Bildung des Peritonealtrichters mit etwa 6 Seidennähten. Durch den Stumpf wird eine Lanzennadel durchgestochen. Die Bauchdecken werden mit tiefen und oberflächlichen Silbernähten geschlossen. Die Oberfläche des Stumpfs und der Cervicallöhle wird mit dem Paquelin ausgebrannt. Um den Stumpf herum wird ein Verband mit Jodoformgaze gelegt. Auf den Stumpf wird Jodoformpulver gebracht, eine Dicke Lage Watte daraufgelegt, und schliesslich das Ganze durch Binden befestigt.

Das Kind war infolge Compression der Nabelschnur zwischen Steiss und Geschwulst abgestorben. Die am nächsten Tag erfolgte Sektion desselben ergab folgenden anatomischen Befund: Asphyxia intrauterina. Es fand sich eine vollständige Atelectase beider Lungen, Hämorrhagieen der Pleuren, des Herzbeutels, der Tymusdrüse, der Nieren und der Gehirnhäute.

Das Kind war männlichen Geschlechts, 56 cm lang, 3750 Gr. schwer und vollständig ausgetragen. Der gerade Durchmesser des Kopfes betrug 12, der senkrechte $10\frac{1}{2}$, der quere $8\frac{1}{4}$ und der schräge $11\frac{3}{4}$ cm. Der grösste Um-

fang des Kopfes betrug 36, der kleinste 33 und der fronto-occipitale $35\frac{1}{2}$ cm. Eine Kopfgeschwulst war ebensowenig vorhanden wie eine Verschiebung der Schädelknochen. Auf der rechten Hinterbacke, sowie in der Gegend des Malleolus externus des rechten Unterschenkels befanden sich etwa 11 cm grosse blaurote Stellen der Haut.

Der Fruchtkuchen wog 640 gr., seine Grösse betrug 20:18 und seine Dicke $2\frac{1}{2}$ cm. Die Form desselben war eine runde, und die Beschaffenheit eine mässig gelappte. Die Eihäute zeigten am Rande einen Einriss; die Trennung war vollständig erfolgt. Die Wasserhaut war vollständig, die Lederhaut fehlte zu 2 Dritteln und die Zellschicht war überall verfettet. Die Eihäute waren mit Kindspech, das in grosser Menge bei der Entwicklung des Kindes abgegangen war, stark getränkt, ebenso die Nabelschnur. Letztere war 47 cm lang, $1\frac{1}{2}$ cm dick, senkte sich 6 cm vom Rande des Mutterkuchens in letztere ein und war linksspiralig gewunden. Eine Umschlingung derselben war nicht vorhanden. Das Fruchtwasser enthielt viel Kindspech.

Auf der unteren Fläche des Mutterkuchens befanden sich 4 kleine, bis erbsengrosse, weisse, oberflächlich gelegene Infarcte.

Das Wochenbett war die ersten 8 Tage etwas fieberhaft, dann gut. Der Stumpf wurde am 21. Juni abgeschnitten. Eine Sekundärnaht wurde nicht angelegt.

Die Mutter wurde am 24. Juli entlassen. Die Schamspalte war geschlossen, die Scheide eng und glatt. Die Portio stand hoch, war kaum angedeutet — ein kleiner Querspalt. Der Douglas drängte sich etwas vor.

Spätere wiederholte Besuche ergaben Wohlbefinden der Frau.

Krankengeschichte II.

Anamnese. Frau K. aus Ziefen, Baselland, Hebamme, verheiratet, 33 Jahre alt, stets gesund gewesen, mit 16 Jahren

erstmalig, 3 wöchentlich 6 Tage lang, stark aber ohne Molimina menstruiert, hat früher 3 Geburten durchgemacht. Das erste Kind lebt noch; 1885 hatte sie einen Abort im III. Monat der Schwangerschaft und 1886 gebar sie am normalen Ende der Schwangerschaft ein lebendes Kind zu Hause, das noch lebt. Am 4. October 1892 hat Patient die letzte Regel gehabt.

Patient war vom 19.—21. November 1892 wegen eines Fibromyoma uteri interstitiale zur Behandlung im Spital. Die damals vorgeschlagene Kastration wurde verweigert. Bis Mitte November letzten Jahres soll der Zustand immer derselbe gewesen sein. Der Tumor zeigte Wachstum. Die Schmerzen sind nicht heftiger geworden. Die Geschwulst wurde während der Regel härter. Letztere war stets sehr stark. Als die Regel im Monat November 1892 wieder eintreten sollte, bekam Patient plötzlich einen stark aufgetriebenen Leib. Seither hielt diese Zunahme des Leibes an, sodass Patient in letzter Zeit beim Atmen Beschwerden hatte, besonders beim Sitzen. Ueber andere Beschwerden klagte Patient nicht. Der Appetit ist im ganzen gut. Fluor ist nicht vorhanden. Der Stuhlgang ist nicht verhalten; geht jedoch ziemlich schwer ab.

Am 20. November 1894 ist die Grösse der Geschwulst folgende: Die obere Grenze befindet sich in der rechten Mamillarlinie am Rippenrand, in der linken 9 cm unter letzterem. Die obere Grenze in der Mittellinie des Körpers befindet sich 5 cm über dem Nabel. Der grösste Umfang beträgt 80, der Umfang am Nabel 78 cm.

Status praesens am 23. I. 1892: Das allgemeine Aussehen der Patientin ist gut. Die Lungen sind normal, ebenso die Herzgrenzen. Jedoch ist der I. Ton an der Mitralis unrein. Die Brüste sind schwach entwickelt. Die untere Grenze der Leber befindet sich 2 Finger oberhalb des Thoraxrands. Der grösste Umfang des Bauches beträgt $89\frac{1}{2}$ cm. Die Geschwulst ist weich, elastisch, grenzt

rechts an den Rippenrand, links einen Finger breit unter diesen. Die Geschwulst rechts ist hart, links weicher; sie zeigt hier auch dunkle Fluctuation und wird beim Reiben hart. Diese linksseitige Geschwulst wird sofort als schwangere Gebärmutter erkannt. Die Entfernung von der Symphyse zum Nabel beträgt 19, vom Nabel zum Schwertfortsatz des Brustbeins 13 cm.

Der Eingang in die Scheide sowie letztere selbst sind bläulich verfärbt. Die Scheide ist mittelweit. Die Portio hat Cylindergestalt, ist 1 cm lang und mässig hart. Der äussere Muttermund stellt einen geschlossenen Querspalt dar. Der Körper der Gebärmutter ist von aussen als Geschwulst zu fühlen. Über dem Scheidengewölbe ist bei innerer Untersuchung ringsum die Geschwulst zu fühlen, die nur wenig in's kleine Becken ragt.

Der Harn enthält kein Eiweiss.

Die Diagnose lautete: *Myoma uteri interstitiale et subserosum in graviditate.*

Behandlung: Wegen der hochgradigen Beschwerden und der Unmöglichkeit die Schwangerschaft auszutragen wird die Entfernung derschwangeren Gebärmutter beschlossen.

Ausführung der Operation: Am 31. Januar 1893 wird von Herrn Professor Fehling die *Amputatio uteri supravaginalis* ausgeführt. Die Operation nahm eine Stunde in Anspruch.

Es wird zunächst die Chloroformnarcose eingeleitet. Die Bauchdecken werden sodann in der üblichen Weise desinficiert. Hierauf wird ein Bauchschnitt in der *Linea alba* gemacht, von der Symphyse bis etwa 3 cm über den Nabel reichend. Die Bauchdecken sind kaum 1 cm dick. Das Bauchfell wird mit Fritsch'schen Peritonealzangen fixiert. Der untere Wundwinkel wird an's Bauchfell angenäht. Die Geschwulst hat eine glatte Oberfläche. Das Bauchfell ist stellenweise darüber etwas verschieblich. Die

Geschwulst sieht bläulich aus; ohne grosse Schwierigkeit wird sie aus der Bauchhöhle herausgehoben. Die Därme werden mit Schwämmen zurückgehalten. Dann wird die Geschwulst in die Höhe gehalten. Da die Harnblase von der Geschwulst in die Höhe gezogen ist, wird das Bauchfell vorn an der Geschwulst etwa Handbreite oberhalb des inneren Muttermunds quer durchtrennt, nach abwärts präpariert, so dass die Harnblase abwärts sinkt. So erst ist es möglich in der Gegend des inneren Muttermunds eine elastische Ligatur anzulegen. Nach Schutz der Bauchhöhle mit Mullcompressen wird ungefähr 6—7 cm über der Ligatur die Geschwulstmasse quer abgetrennt. Beim Durchschneiden fliesst sehr viel Blut aus den weiten Venen der Geschwulstmasse. Das Parietalperitoneum wird vorn, seitlich und hinten mit dem Bauchfell des Gebärmutterstumpfes unmittelbar unterhalb der Ligatur mit Catgut vernäht. Nach Säuberung des Bauchfells wird eine fortlaufende Bauchfellnaht mit Catgut angelegt. Der obere Teil der Bauchwunde wird mit Silberdraht vernäht, während der untere Teil offen gelassen wird. Dieser letztere bildet um den Stumpf herum einen Trichter. Die Stümpfe der Anhängsel der Gebärmutter werden an beiden Seiten des Gebärmutterstumpfes mit Catgut angenäht. Der Stumpf wird mit dem Paquelin oberflächlich verschorft. Der Trichter wird mit Jodoformpulver bestreut und tamponiert. Durch den Stumpf wird eine Lanzennadel quer hindurchgestossen; über deren Enden wird je ein Schlauch gestülpt. Zwischen die einzelnen Bauchnähte kommen Jodoformmeschen; Jodoformgaze; Watte; Druckverband. Patientin erhält 2 Spritzen Campher. Sonst ist die Narcoese gut.

An dem Praeparate sehen wir eine etwa 25 cm lange, 22 cm breite und 12 cm dicke Geschwulst. Links seitlich ist die Gebärmutterhöhlung lang und schmal, bogenförmig um die Geschwulst herum, bis an den Fundus (s. Fehling's Lehrbuch S. 309). Rechts daneben befindet sich eine Geschwulst, die aus vielen interstitiellen Myomen

zusammengesetzt ist. Auf dem Durchschnitt des Stumpfes ist die Eihauthöhle getroffen und des Fruchtwasser abgeflossen. Der Mutterkuchen ist etwa handtellergröss und sitzt an der medialen Seite. Der Foetus ist männlichen Geschlechts und hat eine Länge von $19\frac{1}{2}$ cm. Die Decidua ist weiss und in starker Verfettung begriffen.

Der Verlauf war die ersten vier Tage etwas fieberhaft (Maximum: 38,8), dann glatt. Nach Abtragung des Stumpfes am 23. Februar 1893 wird später, am 28. Februar 1893 die Secundärnaht angelegt.

Status der Operierten beim Austritt am 14. Februar 1893:

Gutes Allgemeinbefinden. Patientin verspürt in den unteren Gliedmassen eine leicht Schwäche. Die Bauchnarbe ist 11 cm lang. Im unteren Wundwinkel befindet sich ein haselnussgrosser Granulationsstreifen, der durch den Cervix der Gebärmutter mit der Scheide in Verbindung steht. Patientin soll zu Hause mit Jodoformgaze verbinden.

Februar 1894 stellte sich Patientin im besten Wohlsein vor, Trichter verheilt. Kein Bauchbruch. Patientin kann ihrem Beruf als Hebamme wieder ungestört nachgehen.

Krankengeschichte III.

Anamnese: Frau B., 27 Jahr alt, seit $1\frac{1}{2}$ Jahr verheiratet, seit dem 15. Lebensjahre alle 4 Wochen 3 Tage lang, regelmässig, stark ohne Molimina menstruiert, hat noch nie geboren.

Am 24. Januar 1894 wollte Patientin von einem hohen Kasten einen Gegenstand herunter langen, wobei sie sich strecken musste. Patientin verspürte dabei plötzlich einen heftigen Schmerz in der Unterleibsgegend. Seit dieser Zeit hatte Patientin daselbst fortwährende Schmerzen, bisweilen krampfartige Schmerzen im ganzen Unterleib. Am 27. Januar musste Patientin zweimal brechen. Seit 2 Tagen

besteht Windverhaltung, während früher der Stuhl ebenso wie das Wasserlassen stets in Ordnung gewesen sein sollen. Gestern und heute sollen Spuren von Blut abgegangen sein. Die Regel ist seit 6 Wochen ausgeblieben. Der Ehemann giebt an, der Leib sei immer aufgetrieben gewesen. Patientin will aber erst seit 14 Tagen eine Zunahme des Leibsumfangs bemerkt haben.

Status praesens 29. I. 1894: Patient zeigt ein sehr anaemisches Aussehen. Die Brüste sind schlaff und schlecht entwickelt, der Bauch ist aufgetrieben, hart und empfindlich. Im Unterleib eine Geschwulst, die rechts bis zum Rippenrand, links bis ein Finger unter den Rippenbogen reicht. Die Geschwulst ist im ganzen weich, elastisch, dunkel fluktuierend, giebt aber keine so deutliche Welle wie sonst eine Eierstockgeschwulst. Die Vulva ist geschlossen, die Scheide weit und oben etwas rauh. Die vordere Scheidenwand ist etwas bläulich verfärbt. Der Scheidenanteil der Gebärmutter ist weich und steht in der Führungslinie. Der Muttermund klappt etwas. Im vorderen Scheidengewölbe fühlt man eine Geschwulst, die mit der Portio zusammenhängt, hart ist und sehr wahrscheinlich den etwas vergrösserten Körper der Gebärmutterdarstellt. Aus dem Cervix kommt ein schmieriger Ausfluss, die von aussen fühlbare Geschwulst ist bei der inneren Untersuchung unerreichbar. Rechts neben der Portio ist eine kleine, höckrige Geschwulst von der Grösse eines Kirschkernes zu fühlen. Im linken Scheidengewölbe fühlt man deutlich die Pulsation der Arteria uterina.

Vom Rectum aus fühlt man an der Hinterwand der Gebärmutter in der Höhle des inneren Muttermunds ein Myom von der Grösse einer Haselnuss.

Die Diagnose lautete: Multiple Myome der Gebärmutter bei beginnender Schwangerschaft, wahrscheinlich Stieldrehung einer Eierstockgeschwulst.

Behandlung: Wegen des raschen Wachstums der Geschwulst und entzündlicher Erscheinungen von seiten des

Bauchfells infolge Stieldrehung, sowie wegen fibroider Entartung der Gebärmutter beschloss Herr Professor Fehling die Myomotomie mit Versenkung des Stiels und doppelseitiger Kastration zu machen, eine Operation, die auch am 1. Februar 1894 ausgeführt wurde. Die Dauer derselben betrug 55 Minuten.

Beschreibung der Operation:

Es wird die Chloroformnarkose eingeleitet und die Bauchdecken werden desinficiert, hernach wird ein Schnitt in der Linea alba gemacht, das Bauchfell eröffnet. Man sieht jetzt eine kugelige weiche, undeutlich fluktuierende und die ganze Bauchhöhle ausfüllende Geschwulst. Dieselbe wird, da man noch im Zweifel ist, ob eine Eierstocksgeschwulst vorliegt, mit einem Troicar punktiert. Dabei aber entleert sich keine Flüssigkeit. Aus der Punktionsöffnung blutet es ziemlich stark. Dieselbe wird durch eine provisorische Klemme geschlossen. Die Geschwulst wird dann mit den Händen aus der Bauchhöhle herausgehebelt, was ob der Grösse und des Gewichts derselben nicht gerade leicht war. Einzelne Verklebungen mit der Bauchwandung, meist sehr gefässreich, werden theils stumpf abgelöst, theils zwischen 2 Ligaturen durchschnitten. Nachdem die Geschwulst aus der Bauchhöhle herausgewälzt war, zeigt es sich, dass dieselbe ein gestieltes subseröses Myom ist, das von der rechten vorderen Kante der Gebärmutter ausgegangen ist. Letztere liegt vor der Geschwulst. Auf ihrer Oberfläche befinden sich ausserdem noch mehrere kleinere und grössere Geschwülste subseröser Natur. Die Geschwulst selbst ist äusserst blutreich und aus den weiteren beim Herauswälzen eingerissenen Partien blutet es ziemlich stark. Der fingerdicke Stiel wird mit einer elastischen Ligatur umschnürt, und die Geschwulst abgetragen. Der Stiel derselben ist etwa $1\frac{1}{2}$ mal um seine Axe gedreht. Die ganze Gebärmutter zeigt sich mehrfach mit Myomen durchsetzt. Jetzt werden die rechtsseitigen Anhängsel der Gebärmutter hervorgezogen, das Ligamentum

latum mit einem Deschamps durchstochen und beiderseits mit Catgut unterbunden. Die Muttertrompeten und Eierstöcke werden abgetragen. Auf der linken Seite dasselbe Verfahren. Der ganze Stiel wird noch einmal mit dem die Muttertrompeten umfassenden Faden unterbunden. Schliesslich wird noch durch die Muttertrompete eine Gesammtligatur mit drehrunder Nadel angelegt, die unterhalb der zwei erst angelegten geschnürt wird. Die Gebärmutteranhängsel werden abgetragen. Die beiden Stiele werden mit dem Paquelin verschorft und in die Bauchhöhle versenkt. Der elastisch umschnürte Stiel des Myoms wird ganz nach vorn geschoben, so dass er vorläufig nicht mit der Bauchhöhle in Verbindung steht. Hierauf wird die Bauchfellhöhle mit 0,6% Kochsalzlösung ausgewaschen. Dann wird eine fortlaufende Naht des Bauchfells mit Catgut angelegt. Die Bauchdecken werden mit tiefen und oberflächlichen Silberdrahtnähten vereinigt. Der Verband wird in gewohnter Weise angelegt. Die Narcose hat Patientin gut ertragen.

Die anatomische Untersuchung ergab folgendes:

Die ganze Geschwulst besteht aus glatten Muskelzellen, die an einzelnen Stellen in Verfettung begriffen sind. In einer erweiterten Vene der Abtragungsstelle der Geschwulst, sowie in einigen Venen der Oberfläche sind bis bleistiftdicke, grauröthliche Thrombusmassen. Die anatomische Diagnose lautete auf ein erweichtes Myoma subserosum uteri.

Der Verlauf war fieberfrei. Am Tage nach der Operation ging mit schmierig-blutigen Massen ein Ei von der Grösse eines Taubeneies ab. Dasselbe enthielt Reste eines zu Grunde gegangenen Foetus.

Die Heilung war eine glatte.

Status beim Austritt am 7. 3. 1894.

Länge der Bauchwunde 14 cm. Portio etwas hinter der Führungslinie. Im vorderen Scheidengewölbe liegt die vergrösserte und höckrige Gebärmutter. Sie ragt bis 2 Querfinger breit über die Symphyse.

I. Kolpomyotomien (Tabelle I.)

Im ganzen habe ich in der Litteratur 61 derartige Fälle gefunden. Diese verteilen sich wie folgt:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| A. In graviditate | 7 Fälle. |
| B. In partu | 18 Fälle. |
| (C. Unmittelbar post partum | 17 Fälle. |
| D. In puerperio | 19 Fälle.) |
-

Tabelle I.

Name des Operateurs bezw. Refr.	Datum der Operation. Quelle.	Anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Indication, Zeit und Art der Ausführung der Operation.	Weiterer Verlauf.
1 Guyot.	April 1752. Levret, Mém. sur les polyp. de la matrice et du vagin, Art. 3, pag. 543. Dreisolcher Fälle, wovon dieser der in- teressanteste; cit. nach Horwitz, St. Petersburg. med. Zeitschr. XIV. Band 1868.	Kindskopfgrosser Polyp, dessen Stiel plattegedrückt und bis zwei Querfinger- breit, rechterseits und oben im Cavum uteri befestigt ist.	Anlegung einer Ligatur 5 Stunden post partum. Da- sich aber nach einigen Ta- gen peritonit. Schmerz ein- stellte und der Polyp aus der Scheide hervorragte, so wurde der Stiel desselben unterhalb der Ligatur ab- geschnitten.	Genesung.
2 Pugh.	Treatise on Midwifery 1754 bei Lambert, Thèse. Paris 1870.	Faustgrosses Cervixmyom.	6. Schwangerschaftsmonat. Seit 2 Tagen Wehen. Li- gatur und Excision des Tu- mors.	Spontane Geburt nach $\frac{1}{2}$ Stunde. Genesung. Später 3 normale Geburten.
3 Denmann.	1811 Medic. and. Phys. Journ., vol. XXVII, pag. 467. Citirt nach Davis, the principles and practice of obst. méd., vol I. pag. 615; cfr. Horwitz l. c.	Kindskopfgrosser Polyp.	1 Tag nach langer und schwerer Geburt Ligatur; 1 Tag später festere An- ziehung derselben. Fieber, stinkender Ausfluss etc. der grössere Teil — der Kör- per der Geschwulst erst 4 Wochen post partum abge- stossen.	Heilung, nachdem noch an den dünneren Teil oder den Hals der Geschwulst eine besondere Ligatur appliziert war.

4.	J. Bell. Edinb. medic. Journ. p. 365. 1820, bei Lambert, l. c.	Grosses, gestieltes Fibrom der hinteren Lippe.	Perforation und 2stündige Extraktion der Frucht. Ligatur der breiten Basis der Geschwulst und Ex- cision derselben.	Genesung.
5.	Düntzer. N. Zeitschr. f. Gebk. Band VIII. Heft 2, pag. 219.	Fibröser Polyp von der Grösse eines Borsdorfer Apfels und kleinere inter- stitielle Fibrome.	Entfernung nach einer künstlichen Geburt (Wen- dung auf die Füsse wegen Vorfall beider Arme). Tor- faules Kind.	+ noch am selben Tage.
6.	Heck. N. Zeitschr. f. Gebk. 1841, Bd. 10, pag. 96, bei Süss- erot, i. d. Rostock 1870.	Steatom.	Exstirpation. Die Scheide wird der Länge nach durchschnitten. Ausschälung der Geschwulst.	Zange wegen Wehenman- gel. Lebendes Kind. Genesung.
7.	Robertson. Lond. med. Gaz. 1842, Februar; bei Lehmann; Tijdschr. tot bevording d. Geneeskunst. Maarten April 1854 in Schmidt's Jahrb. Jahrgang 1855. 85. Bd. S. 58 ff.	Polyp, die Scheide aus- füllend und allmählich nach ausssen tretend.	Exstirpation desselben mit dem Messer.	Geburt eines gut entwik- kelten Kindes. Heilung.
8.	Merriman. Bei Lehmann l. c.	Faserpolyp.	Unterbindung und Exstir- pation in partu.	Operation mit Erfolg.

Name des Operateurs bezw. Refr.	Datum der Operation. Quelle.	Anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Indication, Zeit und Art der Ausführung der Operation.	Weiterer Verlauf.
van Doeveren. 9.	Bei Lehmann, l. c.	Faserpolyp.	Unterbindung und Exstirpation in partu.	Operation mit Erfolg.
Aubinais. 10.	Gaz. med. de Paris 1844.	Centrales Aufsitzen der Placenta auf einem Polypen des Corpus uteri. Die Probe die erstere zu lösen, kostete inf. von starken Verwachsungen fast eine Inversio uteri deshalb Umdrehung des Polypen. Gleichzeitige Extraktion beider.		Genesung. Später normale Geburt.
Fiedler. 11.	Summar. 1842, p. 1023. Cit. nach N. Zeitschr. f. Geburtkunde 1846. Bd. 20, p. 103. Bei Horwitz, l. c.	Über dem Os internum rechte- terseits ein stark gestielter Polyp von Pflaumengröße.	Abtrennung desselben mit dem Zeigefinger in puer- perio.	Heilung. Keine Blutung.
Danyau. 12.	Gaz. méd. de Paris 1851, p. 239; Revue méd.—chir. 1851, p. 299; Schmidt's Jahrbüch. Bd. 71, Aug. 1851; Schröder, Lehrb. d. Geburtsh. 11. Aufl. 1891, S. 557; Magdelaine, Thèse. Strassburg 1869, S. 17.	Myom der hinteren Wand des Cervix, das Becken aus- füllend. Umfang 15cm. Gewicht 650gr.	8. Schwangerschaftsmon. Blasensprung. Seit 40 Stun- den continuirl. Blutung. In- cision in die Geschwulst. Die Enucleation gelingt leicht in 2 Stücken.	Geburt eines Kindes in Schädellage mit Vorfal- l eines Fusses. Wendung und Extraction. Kind ma- cerirt. Genesung d. Mutter.
Depaul. 13.	Charbozien, des Fibromes du Col de l'Uter. Paris 1852.	Cervixmyom.	Entfernung desselben in partu.	?

14.	Grimsdale.	Liverp. med. chir. Journ. 1857. Jan. bei Courty, Malad. de l'ut. Marion Sims: Uterine Surgery, p. 107.	hinteren Muttermundslippe.	Kindergrosser Cyst von der Stärke Dichtung. 8 Tage nach der Entbindung mit- telst Perforation und Ex- traction: nterbindung d. Geschwulst.	Genesung. Spätere Ge- burt eines lebenden Kindes.
15.			Kolossalfibromyom der hin- teren Muttermundslippe.	Lebensgefahr! Blutungen im 4. Monat der Schwanger- schaft. Incision in den Tumor. Nach zwei Tagen Abort. darauf Vereiterung des Tumors. Wegen pyä- mischer Erscheinungen wird der grosse zerfallene Tumor entfernt.	
16.	Cazeaux.	Traité des Accouch. 1858, p. 620.	Kindskopfgrosser Tumor im kleinen Becken, der zu fluktuieren scheint. Cervixmyom.	Ende der Schwangerschaft. Seit 4 Tagen ist das Wasser abgeflossen. Spaltung der Geschwulst durch eine tiefe Incision bis auf den kind- lichen Kopf.	Anlegung der Zange ohne vorherigen Versuch der Ent- fernung der Geschwulst. Perforation. Cephalotripsie. † Mutter.
17.	Langenbeck.	Deutsche Klinik 1859, I.	Kindskopfgrosser Tumor des Cervix die ganze Scheide ausfüllend und aus der Vulva zum Vorschein kom- mend.	Geburt seit 3 Tagen. Patient. moribund. Incision in den Tumor. Enucleation ge- lingt leicht.	† infolge Erschöpfung.

Namen des Operateurs bezw. Refer.	Datum der Operation. Quelle.	Anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Indication, Zeit und Art der Ausführung der Operation.	Weiterer Verlauf.
Horwitz. 18.	Musk. med. Zeitschr. 1868, p. 268 (russisch) — Petersb. med. Zeitschr. 14. Bd. 1868 S. 277.	Polyp. der Hinterwand des Corpus uteri, das ganze Cavum einnehmend.	Frühgeburt im 6. Monat 6 Tage post partum: Ent- fernung des Tumors.	Heilung.
Braxton Hicks 19.	Lancet 1870. Juli 30 — Lond. obst. Transact. 12. p. 273. 1871 — Schroeder, l. c. S. 557.	1 ¹ / ₂ pfündiges, submucöses Myom der hinteren Cervical- wand, das ganze Becken ausfüllend.	Geburt seit 12 Stunden im Gange. Vergebliche Wen- dungs- und Zangenversuche Incision in den Tumor. Enucleation leicht.	Forceps. Lebendes Kind Genesung.
Wallace. 20.	Brit. med. Journal 1871, 30. Sept. — Schroeder l. c. S. 557.	Ungestieltes, 420 gr. schweres, grosses, weiches die Vagina ausfüllendes Cervixmyom.	Vergeblicher Forceps. In- cision und Enucleation des Tumors.	Forceps. Asphyktisches Kind. Genesung. Normales Wochen- bett.
Charrier. 21.	Gaz. des hôp. Nro 4, 1875. cit nach Gussow, Neub. des Uterus, Stuttgart. Enke 1886. S. 136.	Festes Uterusfibrom.	Spontaner Austritt der Ge- schwulst aus dem Uterus in die Vagina im VII. Mo- nat der Schwangerschaft ohne Wehenthätigkeit. Ver- jauchung daselbst. 24 Tage später spontane Frühgeburt, die glücklich verlief. Die Geschwulst trat immer tie- fer und es wurde von ihr	

Sydney. Turner (Gloucester). 22.	Brit. med. Journ. 1880. Jul. 31., im Centralbl. f. Gynäk. 4. Jahrg. No. 26; besprochen von Fehling, Stuttgart.	Birn förmiges breit gestieltes Fibromyom der hinteren Lippe mit cystös. Ver- änderung.	stets so viel entfernt, als vor der Vulva lag, bis all- mählich die ganze Ge- schwulst beiseitigt war.	Normale Geburt. Heilung.
Monold. 23.	Monatsschr. f. Geburtsk. 1859, pag. 62; cit. nach Horwitz, l. c.	Ueber den Osintern. rechter- seits ein stark gestielter Polyp von Pflaumengrösse.	Abtrennung desselben mit dem Nagel des Zeigefingers in puerperio.	Heilung. Keine Blutung.
Priestly. 24.	A case of labour. complic. with a fibr. tum. of the Uter. Delivery by long forceps and subsequel re- marks of the tumour Broschure. Lond. 1859 pag. 8.	Kleiner mucöser Pölyp, aus dem Cervicalcanal hervor- ragend.	Post abortum: Entfernung.	Bald erneute Conception.
25.	do.	2—3 Zoll aus dem Mutter- mund vorragender fibröser Polyp, mit breiter Basis der hinteren Wand des Uterus aufsitzend.	Nach einer Zangengeburt, die ein lebendes Kind er- gab, Abtragung des Tumors mit dem Ecraseur, nachdem er noch beträchtlich durch den Muttermund durchge- schnitten.	Heftige Blutung. Genesung.

Name des Operateurs bzw. Refer.	Datum der Operation. Quelle.	Anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Indication, Zeit und Art der Ausführung der Operation.	Weiterer Verlauf.
Bailly. 26.	Gaz. des Hôp. 21, citiert nach Schmidts Jahrb. 1880. 185. Band.	Fibröser Uteruspolyp.	Operation post partum, wiederholte Blutungen.	Mutter †
Guéniot, Ref.; op. Maissonneuve. 27.	Gaz. méd. 1881, No. 43. Mittheilung in der Acad. de méd.	Fingerdicker und finger- langer Polyp im Cervical- kanal.	Ende der Schwangerschaft erreicht und dann mittelst serre-noeud von Maissonneu- ve der Polyp abgetragen.	Keine Blutung. Heilung.
Becher. 28.	Zeitschr. f. Geb. und Gyn. 1882: Sitzungsbericht 25. X. 1881.	Ein ins Cavum uteri ragendes Myom.	Nach der Geburt heftige Blutung. Enukleation der (Geschwulst aus seinem Bett, anfangs mit 2 Fingern, dann mit der eingeführten ganzen Hand in wenigen Minuten.	Genesung.
Löhlein. 29.	do.	do.	In ähnlicher Weise post partum ausgeschälte Myome.	Später Geburt eines aus- getragenen Kindes, während früher habituelle Aborte.
Benicke. 30.	do.	2 submucöse Myome, das eine links vorne, das andre rechts hinten.	In der zweiten Woche post partum Herabtreten eines Tumors, was durch Secale ge- fördert wurde. Enukleation der Geschwülste.	Leichtes Fieber. Genesung.

31.	P. Ruge. Zeitschr. f. Geb. und Gyn., Sitzungsbericht 10. I. 1882.	Intraparietal gelegenes Myom.	Geburt eines reifen Kindes. Hernach profuse Blutung, auch nach sofort ausgeführter Placentarlösung weiter be- stehend. Spaltung der Ge- kapsel, Auslösung der Ge- schwulst.	Anfangs günstiger Verlauf des Wochenbetts, später †.
32.	Schroeder. Bei Lomer, Z. f. Geb. und Gyn. 9. 1883.	Kolossalmyom des Cervix das ganze Becken aus- füllend.	Mitte des 10. Schwanger- schaftsmonates: Spaltung der vorderen Cervixwand von der Scheide aus und Enukleation der Geschwulst.	Nach 11—12 Tagen spon- tane Geburt eines lebenden Kindes, jedoch verbunden mit beträchtlicher Blutung. Normales Wochenbett.
33.	Hegar. Berl. klin. Woch. 1883. No. 43, Sitzungsbericht 26. I. 83.	Myoma cervicis, das ganze Becken ausfüllend.	Vor dem Ende der Gravi- dität: Entfernung der Ge- schwulst durch Incision und Enukleation.	Die Nacht darauf Geburt eines lebenden Kindes. Normales Wochenbett.
34.	P. Mundé (New-York). Sep.-Abdr. aus der Gynec. Transact. 1884, Vol. 9; cf. Referat, im Centralbl. f. Gyn. 1887.	Grosses interstitielles Cer- vixfibroid der vorderen Uteruswand und Mutter- mundslipe, 1500 gr schwer.	Im 6. Monat Entschluss der Ausschälung per vaginam gefasst, ohne wie Schroeder das Ende der Schwanger- schaft abzuwarten. Indess plötzlich vorzeitiger Eintritt der Geburt. Manuelle Aus- schälung des Tumors.	Wendung des Extraction. Keine Blutung. Genesung.
35.	I. Halliday Croon. Edinb. med. Journ. 1886 Okt.	Klein-orangengrosser, weicher, dickgestielter, am fundus hängender Polyp.	Frühgeburt im 5. und 6. Monat, heftige Blutungen in der 3. Geburtsperiode. Abdrehung des Tumors mittels Muzeaux'scher Zange.	Gangrän und Janchung des Stumpfes. Tod an acuter Sepsis 6 Tage p. o. †.

Name des Operateurs bezw. Refer.	Datum der Operation. Quelle.	Anatom. Beschaffenheit der Geschwulst.	Indication, Zeit und Art der Ausführung der Operation.	Weiterer Verlauf.
I. Halliday Croom. 36.	Edinb. med. Journ. 1886 Okt.	Klein-orangen-grosser, weicher, dick gestielter am Fundus hängender Polyp.	Am 5. Tage nach normaler Entbindung: profuse Blutung und übler Geruch. Abtrennung des Tumors mit den Fingern von seinem Ansatz am Fundus.	Heilung
Löhlein. 37.	Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 12. 1886: Sitzungsbericht vom 22. I. 1886.	Mehrere theils submucöse theils intramurale Myome.	Im Anschluss an spontan. Abort: Enucleation derselben	Genesung.
Veit. 38.	do.	Kindskopfgrosses Myom in der Vorderwand der Cervix.	Spontane Geburt! Hernach Fieber und profuse Blutung. Enucleation des Tumors in der 3. Woche des Puerperium.	Genesung.
William Day. 39.	Transact. of the Obst. Society of London. Vol. 28. for the year 1885. London 1886. Longmans Green and Co. 8°. 59. and 350 pp. pag. 158, cfr. Schmidts Jahrb. 1886 Bd. 211.	Den Beckeneingang vollständig verlegende Geschwulst von $3\frac{1}{4}$ Pfd.	Zuerst Enucleation von 3 Vierteln des den Beckeneingang verlegenden Tumors in partu. Dann: Leichte Extraction des tiefer getretenen lebenden Kindes. Nach manueller Entfernung der Nachgeburt: Enucleation des Restes der Geschwulst.	Blutverlust gering. 28 Stunden p. o. Exitus letalis infolge Collaps †.

Urwisch. 40.	Vorgängen in der St. Petersb. geb.-gyn. Gesellschaft. Sitzung 14. 5. 1887 (russisch). Referat im Centralbl. f. Gyn. 1887.	Submucöses Fibromyom des Corpus uteri.	Lebensgefährliche Blutungen post partum, infolge Enucleation der Geschwulst.	Genesung.
Anatoli Sani. 41.	Refer. im Journal f. Geb. und Gyn. 1887. Mai (russisch).	Corpusmyom.	Enucleation sofort nach Abgang der Placenta.	Genesung.
C. Meyer Refer. 42.	Diss. inaug. Zürich 1887: 11 Fälle von Schwangerschaft und Geburt etc.	Interstitielles Fibromyom.	Abort im 4. Monat. Verjauchung des Tumors. Enucleation desselben.	Hefige Nachblutung. Tod infolge Pyämie †.
Felsenreich. 43.	Wien. med. Woch. 1887. No. 52.	Citrenengrosser Polyp des Uterus.	Abtragung desselben in graviditate.	Fortbestehen der Gravidität.
Hofmeier. 44.	29. October 1887. Ref. Nebel, münchn. medic. Woch. 1890. No. 3.	In der Vagina faustgrosses, glattes, ganz in der hinteren Lippe sitzendes Myom.	Vor 8 Wochen spontane Geburt, ohne dass ein Tumor bemerkt wurde. Quere Spaltung der Schleimhaut: Leichte, stumpfe Enucleation ringsherum.	Heilung.
Felsenreich. 45.	Wien. klin. Woch. 1889. No. 40.	Polyp des Corpus uteri.	Nach spontanem Abort sofortige Entfernung des Tumors.	Heilung nach Phlegmasia alba doleus.
Tuxen (Jütland). 46.	Hosp. Tidende. 3 R. 7. 24. 1889.	Faustgrosses Fibromyom vom Lab. posterius ausgehend.	3 Wochen nach der durch Wendung erfolgten Entbindung Abtragung der vor 3 Tagen nach einer Ausspülung vor die Vulva gefallenen Geschwulst nach vorheriger doppelter Ligatur.	Unbedeutende Blutung.

Name des Operateurs bezw. Refer.	Datum der Operation Quelle.	Anatom. Beschaffenheit der Geschwulst.	Indication, Zeit und Art der Ausführung der Operation.	Weiterer Verlauf.
Hotmeier 47.	Ref. Nebel: Münch. Med. Woch. 1890. No. 3.	Kindskopfgrosses Fibromy- om der rechten vorderen Cervixwand.	Vor 4 Wochen glatte Ge- burt, 3 Wochen post partum plötzlich Urinbeschwerden. Breite Spaltung der Kapsel und der rechten Cervixwand bis ins Scheidengewölbe. Die Ausschälung der unteren Kuppe des Tumors ge- lingt leicht, weiter oben wird die Enucleation sehr schwierig, gelingt auch nach Spaltung der linken Hälfte der Cervix erst, nach- dem der Tumor durch Aus- schneiden eines grossen Kei- les stark verkleinert worden.	Ausgezeichnete Rück- bildung. Ungetrübter Ver- lauf.
Calderini. 48.	Aus dem Bericht über die Verhandlungen der 8. Ab- teilung des 10. internatio- nalen Congresses. Berlin 4—9./VIII. 1890.	Myoma colli	Enucleation desselben intra partum.	Geburtsverlauf kaum beein- flusst. Heilung.
Calderini 49.	do.	Cystisch-myxomatös degen- erirtes Myom.	Ligatur und Exstirpation im 2. Monat der Gravidität.	Schwangerschaft ungestört.

50. Heltwig, Ref. <i>Obstet. u. Gynäk.</i> Halle 1890; aus der Kaltbach'schen Klinik.	aus der Kaltbach'schen cöses Myom.	Mannesfaustgroßes submucöses Myom.	Abort im 6. Monat. Verjauchung der Geschwulst in Abort an Sepsis †.	Tod 17 Tage nach dem
51. Everke (Bochum)	Wiesbaden. J. F. Bergmann 1893. Separatdruck im Centralblatt für Gyn. 1894. No. 24.	Retrocervicales Myom.	Entfernung des Tumors nach einer Sectio caesarea durch Incision von der Vagina. Herabziehung mittelst Muzen- ausseher Zange. Anschä- lung in toto mit den Fin- gern. Vor der Sectio cae- sarea war eine Probeincision des Tumors ausgeführt worden.	Genesung.
52. Netzel, W.	Hygiea 1890. 52 Bd. No 4 und 5. Srenska Läkaresällsk. Förhandl., p. 99—108.	Necrotisches, 600 gr. schwe- res, einen grossen Teil des Beckens ausfüllendes Myom.	Geburt am normalen Ende: Perforatio capitis und Ex- traction mit dem Kranio- clasten. Am 6. Tage post partum Entfernung eines necrotischen Myoms aus dem Muttermund ohne Schwierig- keit. Zwei Tage später Enucleation einer zweiten Geschwulst mit den Finger, die sich in die Cervixhöhle vorgedrängt hatte.	16 Tage post partum Tod an Sepsis †.

Name des Operateurs bezw. Refer.	Datum der Operation. Quelle.	Anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Indication, Zeit und Art der Ausführung der Operation.	Weiterer Verlauf.
Riedinger (Brünn) 53.	Prag. med. Woch. 1891 No. 15 ff.	Eiförmiges, 13 cm langes, 8 cm breites, weiches, elas- tisches, im rechten Um- fange des Muttermundes drei Viertel desselben ein- nehmendes, bis zur Becken- mitte herabreichendes, das Becken auf 4 cm verengen- des Fibromyom.	1 ¹ / ₂ tägige Geburtsarbeit. Incision in den Tumor von 8 cm Länge. Ausschälung desselben.	Entwicklung eines lebenden 4300 gr schweren Kindes mittels Zange. Starke Blutung im Wochenbett. Fieber. Gangrän der Wunde, Tod infolge Pyämie †.
Hüter (Marburg) 54.	Berl. klin. Woch. 1892. No. 6.	Höckriges, derbes, 6 kg. schweres Myom, den 5-Mark- stückgrossen Muttermund ausfüllend.	Blutabgang in partu. Wehen- thätigkeit erfolgte 4--6 Wochen zu spät und schwach. Wendung und Extraction. Darauf leichte, stückweise Enucleation des Tumors. Kind abgestorben.	Normaler Wochenbettsver- lauf. Vorfall der Nabelschnur.
Sutugin 55.	Wratsch. 1892, No 1 u. 2. Besprochen in Frommels Jahrb. 1891.	Kindskopfgrosses Myom der hinteren Cervixwand.	Spontaner Abort im 4. Mo- nat. Nach 6 Wochen Vagi- nale Amputation des Myoms.	Heilung.
Croom (Edinburg) 56.	Edinb. med. Journ. 1892 Oktober.	Polyp.	Entfernung post partum wegen Blutungen.	

57.	Hofmeier	München. med. 1893. 11.	Woch.	Kopf- und faustgrosse Geschwülste; ein $1\frac{1}{2}$ Faust-grosses, tief in der hinteren Wand des Cervix, das Becken hinten ganz ausfüllendes Myom.	Teils des Tumors mittelst Ecraseur.	Jauchige Endometritis. Heilung.
58.					Vor dem normalen Ende der Geburt: Elevatio spon-tanea des Tumors. Zange. Lebender Knabe. Ergotinge-brauch; deshalb Entfernung der Geschwulst durch die Scheide möglich.	Genesung.
59.	Redfort	Demargue et St. — Vel, Traité clinique des ma-ladies de l'Utér. — Cit. bei Urwitsch. l. c.		Ein auf der hinteren Lippe sitzender Polyp.	Entfernung desselben.	6 Tage p. o. Extraction eines lebenden Kindes mit der Zange.
60.	Vautrin	Congrès français de chir-urgie, ref. Nouv. arch. d'obst. et de gynéc., Supp-lément Nro. 4 pag. 188.		Grosses, gestieltes Fibroid.	Entfernung von der Vagina aus in graviditate.	Fortbestand der Gravidität. Normale Entbindung.
61.	Crofford T. I.	South. Pract. Nashville, Band 15, pag. 279—283; cfr. Frommel's Bericht über das Jahr 1893.		Becken durch ein grosses Fibroid verlegt.	Frühgeburt des 7. Monats seit 6 Tagen im Gange. Die Reduktion des Tumors gelingt soweit, dass Ent-binding möglich. Am 17. Tage Laparotomie, die nach langem Hin- und Herüber-legen mit Castration endete. Schliesslich Verjauchung des Tumors und Enuclea-tion desselben von der Vagina aus.	

A. In graviditate.

Die Zeit der Schwangerschaft, zu der die Operation ausgeführt wurde, war

1 mal im 2. Monat

1 mal im 4. Monat

3 mal nahe dem normalen Ende

der Schwangerschaft

2 mal fehlen die Angaben.

Was die Art der Operation anlangt, so handelte es sich

3 mal um Enucleationen von Cervixmyomen

4 mal um einfache Polypabtragungen.

Der Erfolg der Operation war in sämtlichen 7 Fällen ein guter.

Der Einfluss der Operation auf die bestehende Schwangerschaft äusserte sich folgendermassen:

1 mal Abort 2 Tage p. o. im 4. Monat (Enucleation)

3 mal Fortbestand der Schwangerschaft (1 mal wird über eine normale Entbindung am richtigen Termine berichtet).

3 mal erfolgte — 11 Tage p. o., 6 Tage p. o., die Nacht p. o. — die Geburt lebender Kinder (1 Zange) am normalen Ende der Schwangerschaft.

B. In partu.

Von Operationsarten wurden gemacht:

10 Enucleationen

7 Polypabtragungen.

1 mal ist nichts angegeben.

Der Sitz der Myome war:

1. 11 mal am Cervix

a) 7 mal bei den Enucleationen

b) 3 mal bei den Polypabtragungen

c) 1 mal ist nichts darüber angegeben,

ob die Enucleation oder die Abtragung des Polypen gemacht wurde.

2. 1 mal am Corpus? (Enucleation)
3. 6 mal ist nichts angegeben (2 mal bei Enucleation, 4 mal bei Polypabtragung).

Von Indicationen der Operation sind zu nennen:

- 1 mal continuierliche Blutung;
- 2 mal vergebliche Zangenversuche.

Der Geburtsverlauf war folgender:

- 5 mal Zange (4 lebende Kinder).
- 2 mal Wendung und Extraction (1 mal im 6. Monat,
- 1 mal Fussvorfall bei Schädellage und maceriertem Kind des 8. Monats),

1 mal leichte Extraction eines lebenden Kindes;

4 mal Spontangeburt (1 mal im 6. Monat. In einem Falle später noch 3 normale Geburten);

1 mal Perforation und Cephalotripsie nach vergeblicher Zange;

1 mal Tod vor der Entbindung;

4 mal ist nichts angegeben.

Erfolg der Operation in den 7 Fällen von Polypabtragung:

7 Heilungen	} Mortalität: 00%.
0 Todesfälle	

Erfolg der Operation in den 10 Fällen von Enucleation:

6 Heilungen	} Mortalität: 40%.
4 Todesfälle	

Ursachen der 4 Todesfälle:

a) ?

b) Erschöpfung (Patientin war intra operationem schon moribund!)

c) dto (In partu: Enucleation von $\frac{3}{4}$ der Geschwulst post partum: manuelle Entfernung der Nachgeburt; dann: Enucleation des Restes der Geschwulst!)

d) Pyämie.

C. Unmittelbar post partum

Die Art der Kolpomyotomie war:

8 mal Enucleation;

9 mal Polypabtragung.

Die Myome sassen:

7 mal am Corpus (4 mal bei der Enucleation, 3 mal bei der Polypabtragung)

2 mal am Cervix (1 mal bei der Enucleation, 1 mal bei der Polypabtragung)

8 mal zweifelhaft, wo? (3 mal bei der Enucleation, 2 mal bei der Polypabtragung).

Verlauf der vorausgegangenen Geburten:

4 mal Abort (1 mal im 5.—6. Monat);

1 mal Sect. caes. (Lebendes Kind);

1 mal Perforation;

2 mal Wendung (1 mal Vorfall beider Arme — totfaules Kind; 1 mal Vorfall der Nabelschnur — Wehenthätigkeit 4—6 Wochen zu spät — Kind abgestorben);

1 mal Zange (lebendes Kind);

1 mal Spontangeburt eines reifen Kindes;

7 mal ist nichts angegeben (1 mal Sitz der Placenta auf einem Polypen des Corpus uteri).

Von Indicationen der Operation sind zu nennen:

7 mal Blutungen in der 3. Geburtsperiode.

Erfolg der Operation in den 8 Fällen von Enucleation:

7 Heilungen

1 Todesfall (bei anfänglich günstigem Verlauf); d. h. Mortalität: 12,5%.

Erfolg der Operation in den 9 Fällen von Polypabtragung:

5 Heilungen

3 Todesfälle

1 mal nichts angegeben

} Mortalität: 37,5%.

Von den Ursachen der 3 Todesfälle bei den Polypabtragungen ist hervorzuheben:

1 mal Gangrän und Jauchung des Stumpfes (In den übrigen 2 Fällen nichts genannt).

Spätere Geburten:

2 mal Entbindung von lebenden, ausgetragenen Kindern.

1 mal bald p. o. erneute Empfängnis.

D. In puerperio.

Von Operationsarten wurden gemacht:

9 Enucleationen.

10 Polypabtragungen.

Es handelte sich, was den Sitz der Myome anlangt:

5 mal um Corpusmyome (lauter Polypabtragungen);

7 mal um Cervixmyome (4 mal bei Enucleation, 3 mal bei Polypabtragung);

7 mal ist nichts angegeben (5 mal bei Enucleation; 2 mal bei Polypabtragung).

Der Verlauf der vorausgegangenen Geburten war folgender:

6 mal Abort, bezw. Frühgeburt (2 mal im 4. [1 mal infolge von Blutungen]; 2 mal im 6. und 2 mal im 7. Monat mit Reductio tumoris in partu);

5 mal Spontangeburt;

1 mal lange und schwere Geburt (?);

1 mal Zange (lebendes Kind — Elevatio spontan. tum. in partu);

1 mal Wendung;

2 mal Perforation des Schädels (1 mal Extraction mit dem Kranioclasten);

3 mal ist nichts Näheres angegeben.

Die Indication zum operativen Eingriff gaben ab:

9 mal Verjauchung (1 mal + reichliche Blutung) bezw. Vereiterung (Fall 15) oder Necrose (Fall 52) des Tumors;

3 mal Hervortreten des Tumors vor die Vulva;

2 mal reichliche Blutungen;

1 mal plötzliche Urinbeschwerden infolge eines in partu nicht erkannten Tumors.

Zeitlich getrennte Manipulationen wurden in 3 Fällen gemacht:

a) Ligatur 5 Stunden post partum, nach einigen Tagen Abschneiden des Stiels unterhalb der Ligatur wegen peritonitischer Schmerzen und weil die Geschwulst aus der Vagina hervorragte (Heilung).

b) Ligatur 1 Tag p. p.; 2 Tag später festere Anziehung derselben, 4 Wochen darauf Spontanausstossung der Geschwulst [jedenfalls begünstigt durch die vorhanden gewesene Gangrän] (Heilung).

c) Die Geschwulst trat immer tiefer und es wurde von ihr soviel abgeschnitten, als jedesmal vor der Vulva lag.

Erfolg der Operation in den 9 Fällen von Enucleation:

5 Heilungen (Operation in keinem der 5 Fälle vor der 2. Woche),

3 Todesfälle (2 mal Operation am 8. Tage des Puerperiums; 1 mal nichts angegeben), in sämtlichen 3 Fällen als Folge von Sepsis bezw. Pyämie bei verjauchten bezw. nekrotischem Myom;

1 mal ist nichts angegeben.

Mortalität: 37,50/0,

Erfolg der Operation in den 10 Fällen von Polypabtragung:

9 Heilungen	}	Mortalität: 00/0.
0 Todesfälle		
1 mal nichts angegeben;		

Spätere Geburten:

1 mal Geburt eines lebenden, reifen Kindes.

Ausser den in der Tabelle aufgeführten 61 Fällen habe ich noch folgende finden können:

A. In graviditate.

Soumain. [Cité par Simon. Mém. de l' Acad. de chir. 1763; cfr. Lefour, Thèse d'aggregation, Paris 1880: Tabelle No. 265]. ●

B. In partu.

Farrant Fry, I. [Lancet; I, 10. March. cfr. Schmidts Jahrbücher 1884, 201. Bd. Heft 2; Cit. bei Sutugin, Wratsch (russisch) 1892, 1 und 2, besprochen in Frommel's Jahrbuch 1891].

Brancardora [Sutugin, l. c.]

Fergusson. [Cit. b. Lambert, l. c. p. 116].

Säxinger, Ref. [Prag. Vierteljahrsschr.

1868 2. Bd.]

Wyn Williams [Obst. Transact. 17 p. 172].

Heiss [Süsserot, l. c. S. 21].

Düntzer [?]

Keating [?]

cfr. Gusserow,
Neubildungen
des Uterus.
Enke, Stutt-
gart 1885.

Mutter †

C. In puerperio.

Henry Jeld [?].

Senderling [?].

Ramsay [?]

Kiwisch. [Cit. bei Mannel, Prag. Viertel-
jahrsschr. 1871].

Matthews Duncan [?].

Weber [Monatsschr. f. Geb. 25. pag. 157].

cfr. Gusse-
row, l. c.

Wegen Mangels genauerer Angaben wurden diese Fälle nicht für die Zusammenstellung benutzt.

II. Einfache Myomotomie mit Zurücklassung der schwangern Gebärmutter (Tabelle II).

Die Umschau in der Litteratur hat 55 derartig operierte Fälle ergeben; ausserdem: Stavely Mymectomie during pregnancy. The New-York Journ. of gyn. 1894. t. 1. p. 619.

Tabelle II.

Name des Opérateurs bezw. Refr.	Datum der Operation. Quelle.	Zeit der Schwanger- schaft	Indication und anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Ausgang.
1. Péan.	15. 12. 1874. Klin. chir. 1876 pag. 679. Gaz. des hôp. 1874.	5. Monat der Schwanger- schaft. Letz- tere wurde nicht vorher diagnostiziert.	Fibro-cystischer Kolossalumor.	Genesung. 1 Tag p. o. Abort.
2. Thornton.	4. 6. 1879. Obst. Soc. 1879. Bei Hegar und Kaltenbach, III. Aufl. 1886. Bei Stødsgaard: Hosp. Tidende 1883. No. 14	7.	Gestielte Geschwulst.	Tod 7 Tage p. o. †.
Schroeder.	16. 11. 1879. Z. f. Geb. u. Gyn. Band 5 cfr. Kaltenbach, Centralbl. f. Gyn. 1880, No. 15.	3.	Rasches Wachstum einer grossen subser- ösen, gestielten Geschwulst nebst mehreren kleinen ebenfalls gestielten, subserösen.	Genesung. Rechtzeitige Geburt eines lebenden Kindes mittelst Zange.
4. Hegar.	1. 1880. Oper. Gyn. 2. Aufl. p. 426 cfr. Dorff, Centralbl. f. Gyn. No. 12 1880.	3.	Mannkopfgrosses erweichtes Myom, mit 2 fingerdickem Stiel von rechten Fundal- winkel ausgehend. Peritonitis. Compres- sionserscheinungen. Rasches Wachstum. Bedeutende Adhärenzen.	7 Tage p. o. Tod an Sepsis. †.

5.	Langenbuch (Martin).	U. L. Langer, Berl. klin. Woch. 1886, No. 29 oder bei Gördes, Zeitschr. für Geb. u. Gyn. Bd. 9 (=8. Fall daselbst).	27. 7. 1882.	4.	Ungestieltes Myoma subserosum. Rapides Wachstum desselben.	Starke Ausdehnung des Unterleibs. Hochgradige Respirationstörung.	7 Tage p. o. an Verblutungs-collaps †.
6.	Studsgaard.	cf Langer, l. c. und (Gördes, l. c. (=5. Fall)	19. 12. 1882.	3 1/2 Monat	Gestieltes, kindskopfgrosses Myoma subser. von 525 gr Gewicht.	Kein Abort. Genesung.	Abort am Abend p. o. Heilung nach 4 1/2 Wochen.
7.	Landan.	Berl. klin. Woch. 1885. No. 13.	1885.	3.	2 subseröse, gestielte, Fibrome, rechts kindskopfgross, links hühnereigross.	Heilung. Rechtzeitige Geburt eines ausgetragenen, lebenden Kindes.	
8.	Martin.	Z. f. Geb. und Gyn. 11. 1885 und Berl. klin. Woch. 1885 No. 3. S. 391: Sitzungsbericht vom 13. November 1885.	1885.	5—6	Gestielter, mannskopfgrosser Tumor an der Wand des Fundus. Bedrohliche Druckerscheinungen.	7 Tage p. o. Austossung des Kindes in der Glücks- haube bis zu den Hüften. Verzögerte Placentarentwicklung An demselben Tage: Tod infolge Collaps †.	

Name des Operateurs bezw. Refer.	Datum der Operation. Quelle.	Zeit der Schwanger- schaft	Indication und anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Ausgang.
10. Martin.	2. 11. 1883. Langner l. c. Gördes l. c. (= 6. Fall). Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 12. 1886 (Sitzungsbericht 13. 11. 1885).	4.	Gestieltes Myom. subserös. Drohender Abort mit Blutabgang. Operation zur Rettung der Schwangerschaft.	Heilung ohne Störung der Schwangerschaft. Am 12. Mai 1886 spontane Geburt eines ausgetragenen lebenden Kindes.
11. Schroeder.	1885. Hofmeier, deutsch. med. Woch. 1887, No. 19.	5.	2 kindskopfgrosse ungestielte Tumoren.	Heilung. Schwangerschaft erhalten und ungestört bis zum normalen Ende ver- laufend.
12. Frommel.	12. 10. 1886. Münchn. med. Woch. 1886. No. 52.	5.	Kindskopfgrosser, breibasisiger, teilweise erweichter Tumor. Acut. Peritonitis in- folge von Erweichungszuständen im Tumor.	Genesung, nach 2 Monaten noch: Fortbestand der Gra- vidität.
13. Martin.	20. 10. 1886. Ref. Gördes, l. c. (= 7. Fall)	5.	breit aufsitzendes Myom subseros.	23. 9. Abort. 24. 9. Exit. let. †
14. Martin.	17. 11. 1888. Ref. Gördes, l. c. = 9. Fall.	3.	Myomata subser. et. interstit. pariet. ant. uteri.	Heilung 24. 11. Abort.
15. Bidder.	25. 11. 1888. Geb. gyn. Gesellsch. zu St. Petersb. 15. 12. 1888, besprochen im C. f. Gyn. 1889. — Journ. f. Geb. und Fr. Petersb. 1889. pag. 40.	4—5.	Gestieltes, ins Becken eingekeiltes, 20 Pfd. schweres Myom, von der rechten Seite des Uterus ausgehend. Verwachsungen des Tumors mit der Umgebung.	Tod an Peritonitis. 7 Tage p. o. †

Gordon. 16.	Post. med. Journ. Oct. 1889.	3.	Breitbasig dem Fundus aufsitzendes Fibromyom. Enucleation. Peritoneum über dem Uterus vernäht.	Lebendes Kind am Ende der Schwangerschaft, jedoch heftige Schmerzen in partu. Heilung.
C. v. Braun. 17.	1889. Geb.-gyn. Ges. Wien: Sitz. vom 5. 11. 1886. Ref. im Centralbl. f. Gyn. 14. Jahrg.	4.	4800 gr schweres, breitgestieltes, vom Fundus uteri ausgehendes Myom.	Heilung. Fortbestand der Gravidität.
C. A. Bergh. 18.	1889. Hygiea. Band 51, 1889, No. 5. p. 292.	4.	2 Fibrome; das eine zwei Mannesfäuste gross rechts; das andere kleiner links. Hochgradige Beschwerden.	Heilung. Spontane Geburt eines lebenden Kindes am normalen Ende.
Routier. 19.	Bull. et mém. Soc. de chir. de Paris. 1889, n. s., 15.727.	4.	Kolossalfibrom des Uterus.	?
Routier. 20.	Annal. de Gynéc. 33 pag. 161. Mars 1890.	3.	2415 gr schweres, gestieltes Fibroma uteri. Elastische Ligatur des Stiels. Enucleation und Vernähung des Kapselrestes mit kräftiger Seide.	Heilung. Fortbestand der Schwangerschaft.
W. Netzel. 21.	Hygiea 1890, 52 Bd. No. 1. pag. 1—13. 13. 11. 1889.	4—5.	14 Pfd. schweres, ungestieltes Myom. Zahlreiche Verwachsungen. Teilweise zerfallen, missfarben und stinkend. Rasches Wachstum. Grosse Beschwerden.	Heilung, keine Wehen.

Namen des Operateurs bezw. Refer.	Datum der Operation. Quelle.	Zeit der Schwanger- schaft.	Indication, anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Weiterer Verlauf.
W. Netzel. 22.	Hygiea 1889, 52 Bd. No. 1. pag. 1—12.	4.	Gestielter, mannskopfgrosser Tumor.	Heilung. 10 Tage p. o. Abort.
dto. 23.	13. 11. 1889. do.	5.	Gestieltes, 20 Pfd. schweres Myom.	Heilung 2 Tage p. o. Abort
Pernice; op. Ref. J. Plesch, Diss. inaug. Greifswald 1890. 24.	Operation 12. 4. 1890.	?	Mannskopfgrosses, subseröses mit einem handgelenklickigen Stiel am Fundus uteri sitzendes, 2 1/2 Pfd. schweres und ein linksseitiges, wallnussgrosses und intra- murales Myom, das aber nicht entfernt wurde.	Heilung, kein Abort.
Otto Engstroem (Helsingfors). 25.	1891. Finska Läkaresällskapets Handlingar. 1891. Bd. 33. No. 5. p. 362—392.	5	1700 gr. schweres, kurz gestieltes, vom rechten Horn der Gebärmutter aus- gehendes Myom.	Tod. 4 Tage p. o. an Sepsis †
P. Delbert. 26.	Arch. de gén. p. 209. Févr. in Schmidt's Jahrb. 1892. 234.	?	Un fibro-myome utér. sous — pérít. ad- hérent à la paroi, opération pendant la grossesse.	?
Al. Rosener. 27.	Przeglad lekarski 1892. Nro. 39—41, cfr. Hirsch'scher Jahresb. 1892.	5	Myofibrom. Rasches Wachstum.	Heilung. Abort am Abend nach der Operation.

Mendes de Leon. 28.	Verslag o. d. Nederlandsche Gyn.-Ver. in Ned. Tijdschr. v. Verlosk. Gyn. Bd. 3, p. 133 Oper. 9. 11. 1889.	?	Cystofibroma.	Heilung.
Frommel. 29.	Verhandlungen d. deutschen Gesellsch. f. Gyn. 1891, p. 325.	6	Excision der beiden grössten, breitbasigen, teilweise erreichten und fixierten Tumoren.	2 Tage p. o. Abort. 2 Tage p. o. Tod infolge Nachblutung †.
Hardon. 30.	Verh. d. amerik. Ges. f. Gyn. Bd. 16 für 1891; besprochen im Centralbl. f. Gyn. 1892 (Sitzungsbericht).	4	?	Heilung, keine Unterbrechung d. Schwangerschaft.
Ref. Ter-Mikaelianz. op. Phaenomenoff. 31.	Wratsch 1892, p. 472—92.	5	Gestieltes, subseröses, schnell wachsendes Myom.	Heilung. Glückl. Geburt eines ausgetragenen Kindes.
v. Strauch. 32.	St. Petersburg. med. Woch. 1892. No. 10.	4	Gänseeigrosser Tumor. Rasches Wachstum.	Heilung. Rechtzeitige Geburt eines kräftigen, lebenden Mädchens.
Flaischlen. 33.	Centralbl. f. Gyn. 1892, p. 185	3	Retrouteriner, höckeriger, kindskopfgrosser Tumor, bestehend aus 2 Fibromen, einem gestielten und einem breitbasig aufsitzenden.	Genesung. Rechtzeitige Geburt eines lebenden Kindes.
J. Halliday Croom. 34.	Transact. of the Edinb. obst. soc. Vol. 17, p. 92. Edinb. medic. journ. 1892. Oct.	3	Gestielter autenteriner Tumor.	Heilung. Fortbestand der Gravidität.

Name des Operateurs bezw. Refr.	Datum der Operation. Quelle.	Zeit der Schwanger- schaft.	Indication, anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Ausgang.
J. Halliday Croom. 35.	Transact. of the Edinb. obst. soc. Vol. 17, p. 82. Edinb. medic. journ. 1802. Oct.	2	Gestielter anteuteriner Tumor.	Tod bald p. o. infolge eines alten Aortenfehlers.
v. Rosthorn. 36.	Prager med. Woch. 1892. No. 9. (Sitzungsbericht).	5	Lang gestieltes, subseröses 1 $\frac{1}{2}$ mal tor- quiertes Myom am rechten Horn des Uterus. Verwachsungen. Peritonitis infolge Stieldrehung.	Heilung. Keine Unterbrechung der Schwangerschaft.
Frommel 37.	Münch. med. Woch. 1893. No. 14, pag 262.	?	Grosses linksit. intralig. entwickeltes Myom. Leichte Enucleation.	Heilung. Gravidität ungestört.
Frommel. 38.	do.	5	Gestieltes hühnereigrosses, von der rechten Kante des Uterus ausgehendes Myom. Heftige rechtsseitige Schmerzen infolge Zerrung des Peritoneums durch rasches Wachstum des kleinen Tumors.	Heilung. Schwangerschaft erhalten.
Mackenrod 39.	ref. Centralbl. f. Gyn. 1893. pag. 211. Sitzungsbericht der Ges. f. Geb. und Gyn. zu Berlin v. 10. 2. 93.	3	Blutungen und Kreuzschmerzen. Faust- grosser, gestielter, anteuteriner, vom linken Horn des Uterus ausgehender Tumor. Uterus retroflectiert. Operation zur Auf- haltung des drohenden Abortes.	Heilung. Schwangerschaft erhalten.
Löhlein. 40.	Centralblatt f. Gyn. 1894. No. 19. Sitzungsbericht der med. Ges. Giesßen vom 14. 3. 93. Deutsche med. Woch. 1893. No. 45.	2	Mannskopfgrosses, teilweise cystisch er- weichtes Fibroid.	Heilung. 1 Tag p. o. Abort. Baldige erneute Conception.

Wäpker, Ref. 41.	Im C. f. Gyn. 1894. No. 16.	4	Rechtsseitiger Kolossaltumor.	Heilung. Kein Abort.
Everke (Bochum). 42.	Wiesbaden. I. F. Bergmann. 1893. Sep. — Druck, be- sprochen im C. f. Gyn. 1894. No. 24.	4	2-faustgrosser Tumor.	12 Stunden p. o. Abort.
Everke (Bochum). 43.	do.	3	Kindskopfgrosser Tumor.	Nach 4 Wochen Abort.
Leopold. 44.	Archiv. f. Gyn. 43. Bd. C. f. Gyn. 1894. No. 27.	2	Myomotomie.	Heilung.
Aimé, Guin- ard. 45.	Congrès français de chirur- gie; ref. Nouv. arch. d'obst. et de gyn. Suppl. No. 4. pag. 190. 1893.	3	Vom rechten Uterusrand ausgehendes, das kleine Becken ausfüllendes und in- traligamentär entwickeltes Myom.	Ungestörter Schwanger- schaftsverlauf.
Horwitz, op. 46.	Lundsgaard, E. Gynäkolog. og. obstetr. Meddelelser Bd. 10, Heft 3, pag. 187—93.	5	Geschwulst von der Grösse eines Mannes- herzens, mit einem kurzen dicken Stiel tief unten von der Hinterfläche des Uterus ausgehend, intraligamentär entwickelt. Nach Ligierung des Stiels in mehreren Partieen Ausschälung.	Am 4.—5. Tage p. o. starke wehenartige Schmerzen. Am 10. Tage p. o. plötzlich Dyspnoë, Cyanose, Tempe- ratursteigerung, was aber nach einigen Tagen ver- schwunden war. Nach 2 Monaten Schwangerschaft ungestört.

Name des Operateurs bezw. Refer.	Datum der Operation. Quelle.	Zeit der Schwanger- schaft	Indication, anatom. Beschaffenheit des Tumors.	Ausgang.
Taylor, W. L. 47.	Ann. of Gyn. a. paed. 1892. Bd. 6. No 2, pag 92.	4	Schlechtes Allgemeinzustand. Rasches Wachstum. Rechtsseitiger, intraligamen- tär entwickelter Tumor. Entfernung zweier kleiner subseröser Myome.	Am 6. Tage p. o. Wehen. Extraction eines 4 monat- abgestorbenen Fötus, am folgenden Tag Ausstossung eines lebenden. Phlegmasia albadoleus. Genesung. 14 Mo- nate p. o. Entbindung von einem lebenden Kind am richtigen Termin.
Vautrin. 48.	Congrès français de chirur- gie; rcf. Nouv. arch. d'obst. et de gynéc. Supplément No. 4. pag. 188.	?	Fibroma anteuterinum hinter dem Scham- bein.	Schwangerschaft ungestört Heilung.
Hector Treub (Leyden). 49.	Quatre observations de fi- bromes compliquant la gros- sesse, Arch. de Tocol.; et de Gynéc. Nov. 1894. Vol. 21. No. 11. op. 6. 5. 1893.	6.—7. Woche.	„Tenant compte tant de l'augmentation des douleurs sous l'influence de la gros- sesse commençante, que de la certitude presque absolue que la tumeur intrali- gementaire rendrait de la matrice, je résolus à faire l'ablation de la tumeur“. Subseröses, intraligamentäres Fibromyom des Uterus und Verdrängung des letzteren nach links und des rechten Ovariums nach oben.	Schwangerschaft ungestört. Spontangeburt eines leben- den Kindes 3 Wochen vor dem erwarteten Ende der Schwangerschaft. Wochenbett normal.

50.	29. 10. 1893.	31. 5. 1893.	grosses Fibromyom mit erweichtem Innern. Enucleation der Geschwulst.	
51.	Ogden. Americ. Journ. of Obst. 1889.	?	?	Genesung und Abort.
52.	Homann. Bost. society for med. improv. s. Routier, l. c.	?	?	Genesung und Abort.
53.	Croom. l. c.	?	?	Genesung und Abort.
54.	Frank. Wien. med. Woch. 1892, 42.	?	?	Genesung und Abort.
55.	Runge. Apfelstedt im Arch. f. Gyn. Bd. 48. 1894.	6	2 mannsfaustgrosses, breitgestieltes Myom am Fundus uteri.	2 Tage p. o. Exitus letalis f. Sepsis und Verblutung auszuschliessen. Exitus unter Erscheinungen von Herz- paralyse.

Die Indication gaben in den meisten Fällen das schnelle Wachstum der Geschwülste infolge der Schwangerschaft und die daraus entspringenden Beschwerden aller Art, besonders Druckerscheinungen (heftige Schmerzen, Atmungsstörungen, Kreislaufsstörungen etc.). In manchen Fällen handelte es sich von vornherein um Riesengeschwülste, wozu dann noch eine Schwangerschaft kam. In 2 Fällen war bezweckt den drohenden Abort hintanzuhalten.

Als besondere Complication der Operation, welche die letztere teilweise auch angezeigt erscheinen liessen, seien gleichzeitige „Peritonitiden“ genannt, und zwar erfolgten diese:

- 3 mal infolge Erweichung der Geschwulst;
- 1 mal infolge Stieldrehung der Geschwulst.

Was den Zeitpunkt der Operation anlangt, so wurde letztere ausgeführt:

- 1 mal zwischen 6. und 7. Woche der Schwangerschaft.
- 3 mal im 2. Monat
- 11 mal im 3. „ „ „ „
- 1 mal im 3—4. „ „ „ „
- 12 mal im 4. „ „ „ „
- 2 mal im 4.—5. „ „ „ „
- 10 mal im 5. „ „ „ „
- 2 mal im 5.—6. „ „ „ „
- 2 mal im 6. „ „ „ „
- 1 mal im 7. „ „ „ „
- 10 mal ist nichts angegeben.

Die Geschwülste waren natürlich stets subseröse. Nur in 3 Fällen waren daneben noch eine interstitielle Geschwulst vorhanden, die in einem Falle durch die Operation nicht mit entfernt wurde. Im Uebrigen waren die Geschwülste:

- 21 mal gestielt;
- 5 mal breitbasig;
- 1 mal gestielt und breitbasig (multipel);
- 3 mal ungestielt;

25 mal ist nichts über die Art des Zusammenhangs mit der Gebärmutter angegeben;

- 3 mal cytisch entartet,
- 4 mal erweicht,
- 1 mal teilweise zerfallen,
- 5 mal fixiert,
- 9 mal multipel,
- 5 mal intraligamentär.

Der Einfluss der Operation auf die bestehende Schwangerschaft äusserte sich folgendermassen:

- 27 mal Schwangerschaft ungestört;
- 18 mal Unterbrechung derselben;

6 mal erfolgte bald nach der Operation der tötliche Ausgang, sodass es dahin gestellt bleibt, ob Wehen eingetreten wären oder nicht.

4 mal ist nichts angegeben.

Das bedeutet für die einfache Myomotomie mit Zurücklassung der schwangeren Gebärmutter eine Unterbrechung der bestehenden Schwangerschaft in 40 %.

Das Zeitintervall zwischen Operation und Geburt betrug:

- 2 mal einige Stunden (am Abend des Operationstages)
- 1 mal 12 Stunden
- 2 mal 1 Tag
- 2 mal 2 Tage
- 1 mal 3 Tage
- 1 mal 4 Tage
- 1 mal 6 Tage
- 2 mal 7 Tage (ein mal Abort in der Glückshaube)
- 1 mal 10 Tage
- 1 mal 4 Wochen
- 4 mal nichts angegeben.

Berichte über das erreichte normale Ende der Schwangerschaft in den 27 ohne Unterbrechung der letzteren verlaufenden Fällen (65,85%) liegen von 11 Autoren vor. In 10 Fällen wird über die Geburt lebender Kinder berichtet (1 Zange).

Was den Erfolg der Operation anlangt, so erfolgte in 53 Fällen) 2 mal ist nichts angegeben):

Mortalität = 18,87% $\left\{ \begin{array}{l} 43 \text{ mal Genesung} \\ 10 \text{ mal der Tod (3 mal in Fällen} \\ \text{vorhergegangenen Aborts und zwar:} \end{array} \right.$

1 mal infolge eines alten Aorten-Fehlers,

3 mal in folge Verblutungscollapses, 7 bzw. 3 Tage p. o.

3 mal am 4. bzw. 7. Tage infolge Sepsis bzw.

Peritonitis.

1 mal 2 Tage p. o. unter Erscheinungen v. Herzparalyse.

2 mal am 7. bzw. 4. Tage ohne Nennung der Ursache.

Spätere Geburten:

1 mal 14 Monate p. o. (!) Geburt eines reifen lebenden Kindes.

III. Amputationes uteri gravidı et myomatosi supravaginales (Tabelle III).

Es war mir möglich 55 derartige Fälle sammeln zu können.

Eine Bemerkung möchte ich hier gleich anschliessen. In Frommels Jahresbericht 1892, 6. Jahrgang steht folgender Passus: „Lanelonge, Courbin (Diskussion über des ersteren Vortrag), Hauser, Lanvers, machten in zusammen 7 Fällen die supravaginale Amputation des Uterus. Alle genasen. Lanvers behandelte den Stiel bei seinen 3 operierten extra-peritoneal, Hauser intraperitoneal“. In der Tabelle der 55 Amputationen habe ich nun nur je einen Fall von Lanelongue, Hauser und Lanvers angeführt, von den anderen 4 Fällen, von denen im genannten Passus die Rede ist, habe ich nichts gefunden. Trotzdem werde ich nicht verfehlen bei der prozentualen Berechnung des Erfolges der Amputation und der beiden Arten der Stumpfbehandlung, der extra- und intraperitonealen, von diesem Passus Gebrauch zu machen, indem ich in Klammer das jedesmalige Resultat mit Bezug auf letzteren beifüge.

Name des Operateurs bezw. Refer.	Alter der Frauen. Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung, Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Barnes, op. 1877. (Obst. Journ. No. 50. nach Virchow- Hirsch 1877. Bd. II. S. 554. und C. f. Gyn. 1878 S. 77). St. George- Hospital Re- ports 1877. Lefour No. 33. 1.	I p.	2.	Multiple Uterusfibro- ide der vorderen Wand. Uterus zwischen 2 Fibroiden eingeklemmt, das grössere an der hin- teren Wand, das kleine Becken ganz ausfüllend und unter das Promontorium eingekleilt.	Uterus stark nach vorn dislociert. Tu- moren u. Peritoneum stark entzündet.	Amput. uter. suprav. Der hintere Teil des grossen Tumors erwies sich infolge des Drucks gegen das Os sacrum gan- graeuös.	+ 2 mo- nach natlich 36 Std.	Die Diagnose auf Gravidität wurde nicht vorher ge- stellt.
Dorff. (Refer.) im Centrall. f. Gyn. No. 12. 1880. Op. 21. 10. 1879 von Kaltenbach. 2.	36 J. I p.	8. Woche	2 vom Fundus uter. ausgehende, sich mit sehr kurzem Stiel in- serierende, subser. Fibromyome, das eine gänseeigross, das andere kindskopf- gross.	Beständige Schmerzen. Recurrie- rende peritonit. Ent- zündungerscheinun- gen. Unfähigkeit zu gehen. Indicatio vi- talis.	Versuch beide Tu- moren für sich zu entfernen, muss we- gen unstillbarer Blu- tungen abgegeben werden; inde ampu- tatio! Versorgung des Stumpfes schliess- lich durch eine ein- zige elastische Li- gatur, da die eine Partie der zuerst an- gelegten doppelten	Hei- lung.	Am 10. Tage Ent- fernung der Li- gatur, am 12. letz- ter Stumpfrest ab- gestossen. Rekon- valescenz durch Blasenecarr hin- die Länge ge- zogen.

Name des Opérateurs bezw. Refr.	Alter der Frauen Wie- viele Geburt.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Kaltenbach op. 2. 3. 1880; cfr. Dorff Ref.) Centralbl. f. Gyn. 1880. No. 12. 5. Juni. 3.	32 J. II p.	5.	Ein dem Fundus links und breit aufsteigender über mannskopf- grosser, erweichter, interstit. 10 cm über den Nabel reichender Tumor von 3350 gr. Gewicht minus Ei. Im Innern desselben zahlreiche Erwei- chungsherde. Am Corpus und Collum noch mehrere kleine Fibrome. Die Pla- centa inserirt auf dem Tumor.	Vor 2 Jahren: Abort im 2. Monat, darauf 5 Monate lang dau- ernde Blutungen. Rasches Wachstum des Tumors und Com- pressionerscheinun- gen höchsten Grades. Indic. vital. Keine Herztöne hör- bar. Nächtliche Diarrhoëen.	Drahtligatur schon bei leichtem An- schnüren durch das weiche, fettig ent- artete Uterusgewebe geschnitten. Beide Ova- rien, zu apfelgrossen Tumoren cystisch ent- artet, wurden für sich nach vorheriger Ligatur entfernt.	Hei- lung.	Nach der Operat.: Bauchdeckenab- sciss. Zerrungsbe- schwerden inf. einer verwach- senen Inguinal- hernie auf der lin- ken Seite. Am 6. Tage Entfer- nung der Ligatur, von da ab fieber- frei; am 15. Stumpfrest abge- fallen, am 40. auf- gestanden; voll- kommene Er- holung. Letzte Nachrichten 1 Jahr p. o.

18. 3. 1887. (Extr. au Bull. de l'Acad. royale de méd. Bd. 14. 3. série. No. 4. Bru- nelles) (Cen- tralbl. f. Gyn. 1880, 15).	II p.	des t. t. et. et. b. r. e. i- basiges Myom von 4500 gr. Gewicht, von zahlreichen Cysten durchsetzt, anschei- nend in beginnendem Zerfall.	um 4. Monat; fettige Schmerzen, Appetit- losigkeit, Erbrechen, Abmagerung, Re- spiration erschwert. Urinträufeln. Harn- drang. Hartnäckige Verstopfung. Keine Nachtrube seit 2 1/2 Monaten.	2 cm oben, des Os intern abgetragen, der Stiel versenkt. Blutung ziemlich stark.	6 Tage. p. o. Sepsis?	mussten peritonit. Verwachungen, zum Teil dicke Stränge unterbun- den und durch- trennt werden.
Nieberding op. 1882. (Nieb., Beitr. z. My- otomie. Ärztl. Intelli- genzblatt. München 1882. No. 37 u. 38. Sitzung der Würzb. phys. med. Ges., Würzb. 1882. 5.	42 J.	3. Ein grosser solider bis an die Magengrube reichender Tumor, be- stehend aus 2 Ab- schnitten, einem grö- seren unteren und kleineren oberen. (Über ersterem: Ute- ringeräusch.	Seit 3 Monaten rapid. Wachstum d. Tumors. Hochgradige Com- pressionserschei- nungen d. Abdominal- und Brustorgane, Peritonit. Reiz- erscheinungen.	Versenkung des Stumpfes.	† 49 h. p. o. inf. sep- tisch. Peri- tonitis.	Die Fruchtblase wurde angeschn. Es ging von dem im Cervikal- canal steckenge- bliebenen und dort zersetzten Eihaut- fetzen eine In- fection des Stiels und sept. Peri- tonitis aus.
Thornton, op. 1882 (The Bri- tish Méd. Journ. 22. Ju- ly 1882. S. 143. — Ref. nach Wells Spencer, Diagnose und chir. Behandl. der Abdomi- natum. Wien 1886. 6.	38 J.	5. Multiple Fibroide am Fundus; einige davon cystisch erweicht.	Rapides Wachstum, unerträgliche Be- schwerden. Elendes Aussehen. Peritonitis.	Extraperitoneale Stielversorgung.	Hei- lung.	Bei der Operation mussten ausge- dehnte Verwach- sungen getrennt werden.

Name des Operateurs bezw. Refr.	Alter der Frauen Wie- vielte Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Savage, op. 13. 7. 1882 (The Brit. Med. Journ. 2. 9. 1882. S. 423. citirt nach Vogel, D. i. Giessen 1886. 7.	25 J. I p.	4.	Sehr hartes, 9 Pfd. schweres Fibromyom. ausgehend von der rechten Kaute des Uterus.	Beständiges Er- brechen, Schlaflosig- keit. Heftige Schmer- zen. Täglich zuneh- mende Abmagerung.	Extraperitoneale Stielversorgung.	Hei- lung. 4 Mon.	Ungestörter Ver- lauf. Die rechte Tuba und das r. Ovarium durch den Druck fast schwarz geword.
Schroeder, op. 1883 (Ref. Hofmeier, My- otomie etc. Stutt- gart, 1884. 8.	41 J. I p.	3.	Uterus von zahl- reichen knolligen My- om. von Apfel- bis Faustgrösse durch- setzt. Am oberen Teil sitzen mannskopf- grosse Myome.	Rapides Wachstum, zwei unregelmässige Blutungen.	Stumpf versenkt.	Hei- lung. 3 Mon.	
Walter, op. 1883 (A case of hysteric for uter. fibrom. By Walter. The Brit. Med. Journ. 1883. S. 718. cit. nach Vogel. l. c. 9.	29 J.	2?	Der Tumor geht aus vom rechten unteren Uterussegment und liegt zum Teil zwischen Lig. lat. dextr. Links am Uter. 2 kleine Fibrome. Der Haupttumor wiegt 9 Pfd.	Heftige Schmerzen mit wiederholten peri- tonischen Er- scheinungen.	Extraperitoneale Stumpfbehandlung.	+ 9 Tage p. o. an sept. Peri- tonitis.	Bei der Operation finden sich Ver- wachungen des Tumors mit der Bauchwand, zwi- schen ihm und dem Peritoneum entzündliche Schwarten. Zahl- reiche Verwach- sungen mit Bauch- wand, Netz und Mesenterium müssen gelöst

op. 1884 (Brit. Med. Journ. 1888. June, p. 135). 10.	I p.	ausfüllender Tumor.	vorher. Beendigung der Geburt wegen Grösse und Sitz des Tumors unmöglich.	traperitoneale Behandlung des Stiels.	ge p. o. war + sehr ungünstigen Bedingungen (Angaben fehlen).
Granville Bantorp. op. April 1884. (Spencer Wells l. c.) 11.	3.	2 Tumoren, der eine gross und cystös am linken Winkel; der andere mehr solide, aber auch zum Teil Cysten enthaltend am rechten Winkel des Fundus.		Extraperitoneale Stielbehandlung.	3 mon. natl. Frucht
Schroeder. op. 21. 6. 1884 (Ref. Hofmeier, l. c.). 12.	40 J.	2—3. Der ungemein hyperämische Uterus ist mit zahlreichen kleineren und grösseren Fibroiden durchsetzt, von dem linken Horn geht ein mannskopfgrosser, knolliger, fibroeser Tumor aus.	Rapides Wachstum d. Tumors. Unerträgliche Beschwerden.	Amputation dicht über dem Os intern., so dass am Präparat die Espitze gerade heraussteht. Stielverintraperit. Stielversorgung.	Bei der Operation starke venöse Blutungen aus dem grossen Tumor. Entlassung nach normaler Reconvalescenz am 21. Tage p. o. Nach der Amput. wurde das intakte Ei durch die Elasticität des Gewebes aus dem Uterus ausgetrieben.
Paterson, op. 11. 12. 84. (Glasg. med. Journ. 1885, April. Ref. von	36 J.	4 Woch. Der Tumor ragt links ziemlich hoch, erstreckt sich nach rechts tief ins Abdomen.	Plötzliches Wachstum des Tumors unter heftigen Schmerzen.	Heilung.	Foetus von 4 Woch. Die Entwicklung des Fibroids aus dem kleinen Becken war schwer. Keine Verwachs-

Name des Operateurs bzw. Refer.	Alter der Frauen. Wieviele Schw.	Oper. in welchem Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung, Indication, Allgemeinzustand.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter — Kind	Bemerkungen.
Zeiss im C. f. Gyn. 1885. S. 622. 13.							ungen. Die Diagnose schwankte zuerst zwischen Haematocoele, Fibroid und Ovarialtumor.
Martin, op. 5. 1. 1885. (Ref. Gördes, Zeitschr. f. Geb. und Gyn. Bd. XX). 14.	34 J.	6.	Myoma uteri gravid.	Foetus seit 4 Wochen abgestorben.	Amp. ut. suprav.	+ inf. Peritonitis hämorrhagica.	
Karström, op. 1886 (Karstr. Myomat. en Gravidit. Hygiea 1887. April, cit. nach d. Jahresbericht über die Fortschritte der Geb. und Gyn. 1. 5. 85. 15.	36 J.	5.	Weiches Myom, intraligamentär und retroperitoneal entwickelt.	Bei der 1. Schwangerschaft Wendung auf den Fuss infolge einer Unterleibsgeschwulst. Probenexcision wegen Vortäuschung infolge von Ascites der weichen Geschwulstpartien. Rasches Wachstum des Tumors. Atemnot. Periodische Urinsuppression. Cessatio mensusum. Eine Fehlgeburt, beträchtliches Wachstum bis 11 Monate.	Der Cervixstumpf wird in der retroperitonealen Höhle fest genäht, und das Peritoneum darüber geschlossen. Intraperiton. Stielversorgung.	5. Monat Heilung.	Verlauf günstig.
Tauffer, op. 5. 11. 1885. (Dimer. Zur	40 J. II p.	2.	Bis über den Nabel reichender Tumor, auf seiner Oberfläch	Eine Fehlgeburt, beträchtliches Wachstum bis 11 Monate.	Amputation in der Gegend des Os in-	Heilung. 2. Monat.	Rekonvalescenz gestört durch

Stielversor- gung nach My- omoperatio- nen C. f. Gyn. 1887. No. 7. 8. S. 119). 16.	33 J. II p.	4.	Interstitieller Tumor der vorderen Wand des Uterus von Manns- kopfgrosse mit einem faustgrossen Erwei- chungs-herde i. Innern mit 250 gr Flüssig- keit. Gewicht 7 Pfd. Die hintere Wand war bis auf 2 mm Dicke arrodiert.	Kleinbeckenorgane.	1 Abort im 3. Monat. Hochgradige Com- pressionserscheinun- gen und rasches Wachstum des Tu- mors.	Extraperiton. Stiel- behandlung. Chlor- zink-Tannin-Salicyl.	Hei- lung.	4 Monat.	Bei der Unter- bindung der Sper- matalbündel gleiten die Liga- turen ab. Die heftige Blutung wird durch tiefe Umstechung ge- stellt. Bei der Ab- tragung des Uterus fällt die Fruchtblase vor; sie wird durch- schnitten und es ergiesst sich Blut und Fruchtwasser in die Bauchhöhle. Fieberloser Ver- lauf. P. erfreut sich blühender Gesundheit und ist fett geworden. Diagnose vorher nicht gestellt.	und Jareh. leichten Blasenkatarrh. Absicht der Ex- stirpation des Tumors; allein letzterer ist breit- basig, intraliga- mentär und retro- peritoneal.
Granville Bau- tock, op. 1886 (Brit. Med. Journ. 1888. June p. 1331). 18.	34 J. I p.	3-4.	Uterus-fibroid: 2 ge- stielte Myome; das eine 11 Pfd. schwer in grosser Ausdeh- nung mit dem Netz verwachsen; das an- dere 1 1/2 Pfd.	Extraperitoneale Ver- sorgung des Stumpfs.	Indication: Rasches Wachstum.	Hei- lung.	3 1/3 Monate altes Ei.			

Name des Operateurs bezw. Refr.	Alter der Frauen Wie- viele Geburt.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Etheridge, op. 1886 (Journ. of the Amer. med.assoc. 1886. Okt. 23. p. 466. Cit. nach C. f. Gyn. 1887. 26). 19.	34 J.	3.	Grosses Fibrom, die vordere Wand des Uterus einnehmend, mit mehreren Erwei- chungsherden.	Künstlicher Abort war ohne Erfolg. Re- troflexio Uteri. Ras- ches Wachstum. Be- drohliche Drucker- scheinungen von Sei- ten des Tumors.	Intraperitoneale Stumpfbehandlung.	+ 11 Tg. 3. Monat. p. o. an Sepsis.	
Granville Bantock, op. 1887 (Brit. med. Journ. 1888 June. p. 1331). 20.	40 J. 6 p.	4.		Rasches Wachstum des Tumors war die Indication und daraus hervorgehende Dys- pnoë. Starkes Oedem der äusseren Genita- lien und Beine.	Extraperitoneale Stielversorgung.	Hei- lung.	Die Diagnose war auf Ovarialtumor und Schwäng. ge- stellt. Es handelte sich indessen um Fibroid + Hy- drannion + Zwillinge.
do. 21.	31 J. II p.	?	Multiple Fibroide.	Indication: Verbin- derung einer wieder- holten Conception.	Extraperitoneale Stielversorgung.	Hei- lung.	Abge- storbe- nes Kind.
Meredith, Op. 1887 (Brit. med. Journ. 1888. June. p. 1331). 22.	47 J. II p.	5.	Mannskopfgrosses, interstitielles Myom auf der rechten Seite des Uterus.	Indication: Rasches Wachstum des Myoms und dadurch Com- pression der Abdo- minalorgane.	Extraperitoneale Stielversorgung.	+ 3 Ta- ge p. o. an Sep- sis. Hy- dram- nion.	Die Diagnose war vorher nicht ge- steilt worden. Be- sichtigt war die einfache Myo- tomie.
Fritsch, op. (Volkms. Samml. kl. 1889. Vortr. N. 220. 92)	47 J. II p.	?	Multiple Myome.	Rasches Wachstum der Tumoren. Com- pression der Adomi- nallorgane.	Extraperitoneale Stielversorgung.	Hei- lung.	

Die Diagnose der Schwangerschaft wurde nicht gestellt.

Zuerst isolierte Abbin-
dung des Tumors
und Abtragung; dann
Amput. ut. suprav.
Extrap. Stielversor-
gung.

Mannskopfgrosses,
mit dünnem Stiel vom
rechten Horn des
Uterus ausgehendes
Myom.

38 J.
I p.

Meredith, op.
1887 (I. c.)
24.

† 6 Ta-
ge p. o.
an dop-
pelsei-
tiger
Pneu-
monie.
† 4. 7.
1888.

Myomata interstitia-
lia uteri gravid.

40 J.
3.—4.

Martin, op. 23.
6. 1888. Ref.
Gördes I. c.
Tabelle II).
25.

Hei-
lung.

In der hinteren Wand
des Uterus tief unten,
besonders aber in der
vorderen mehrere bis
kleinfaustgrosse tief
in der Muskulatur
sitzende Myome.

37 J.
II p.

Martin, op. 11
11. 1888. (Ref.
Gördes, I. c.
in Tabelle II).
26.

Exstirpatio uteri gra-
vidicum myom. in-
tramm. et adnexis.
Ein T-förmiges Drain-
rohr nach der Scheide
geführt.

Enorme Beschwerden,
Appetitlosigkeit, Ver-
stimmung. 1 Abort
früher. Grosse Hin-
fälligkeit der Patien-
tin.

Am 15. Tage konn-
te P. aufstehen.
Entlassung erst
am 33. Tage nach
ihrer Aufnahme,
da sie Schmerzen
in der linken Knie-
und Schulterge-
gend
hatte, was wahr-
scheinlich auf
thrombotische
Vorgänge zurück-
zuführen.

37 J.
II p.

Martin, op. 11
11. 1888. (Ref.
Gördes, I. c.
in Tabelle II).
26.

Foetus
in
Steiss-
lage.

Hei-
lung.

Hei-
lung.

Intraperitoneale
Stielversorgung.

37 J.

Springfeld.
op. 15. 9. 1888
(Ref. Battes, D.
i. Bonn 1890.
27.

5. Mo-
nat.

Name des Operateurs bzw. Refr.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter/ Kind	Bemerkungen.
More Madden, op. 1889. (The Lancet 1889, 9. 2., p. 271. 28.		4.	und die Seiten des Uteruskörpers ein. (Obwohl die 3 Tumo- ren, jeder für sich abgekapselt sind, hän- gen sie doch ganz unverschieblich zu- sammen. Die vordere Fläche des Uterus ist besetzt mit mehreren kleinen Myomen v. Wallnuss- bis Hühner- eigrösse.		Intraperitoneale Stielversorgung.	+ 5 Ta- ge p. o. an Pe- ritoni- tis.	Die Operation bot bedeutende Schwierigkeiten infolge starker Entwicklung der Blutgefässe und grosser Brüchig- keit der Gewebe. Die Zurücklas- sung des Uterus war geplant. Es war geplant den Uterus zu- rückzulassen.
Fancourt Barnes. London, op. (16. 5. 1889. The Brit. Gyn. Journ..	32 J.	6.	Hartes Fibroid, mit Eingeweiden u. Netz verwachsen (consta- tiert nach einem Probeschnitt.)	Indication: heftige Schmerzen.	Der Tumor wird erst isoliert abgetragen, dann noch die Amp. supravag. gemacht wegen der vielen In- sulte, die der Uterus	Hei- lung	

29.	Leopold, op. 24. 10. 89. (Arch. f. Gyn. 38. Bd. 1890). 30.	4.	Mannkopfgrosses, weiches Myom der hinteren Uteruswand. An der vorderen lin- ken Wand mehrere kleinere bis eigrosse, subseröse Knoten.	Acute Peritonitis.		Extrap. Behandl. des Stiels. Der besonders hinten verdickte Uter. sieht mit seiner Vorder- fläche nach links. Er wird hervorgewälzt, die Bauchhöhle hinter ihm geschlossen, ein Schlauch ums Collum gelegt, befestigt. Das Peritoneum d. Stum- pfes unterhalb des Schlauchs wird mit dem der Bauchwand rings herum vernäht. Eine Spicknadel durchgelegt und da- rüber der Uterus ab- getrag. Der Stumpf wird verschorft. Extrap. Stielversor- gung. Medianschnitt, später nach oben verlängert. Typische Unterbin- dung der beiden Ligga- lata u. rotunda; hier- auf Anlegung eines schein- bar Schlauch-umsCollum. Einige cm über dem chon. Schlauch vorsichtige verlau- atragung d. Corpus fener samt Adnexis u. Tu-Peris- moren, sodass das tonitis)
	Halter, Refer. (Wien, klin. Votr. 1891.) Oper. am 30. I. 1890. Ausd. Frauen- klin. d. Prof. Ehrendorfer. Internat. klin. Rundschau	Schw. von 6--7 Woch.	Multiple Myome: An der linken hinteren Seite des Uterus ein ovales u. vaginal im Becken eingekeiltes Fibrom ($1\frac{1}{2}$ kg. schwer), handteller- breit an der hinteren Uteruswand inserie- rend, den Douglas stark ausdehnend Am Fundus ein klein-	Rasches Wachstum d. Tumoren seit dem Ausbleiben d. Periode. Erscheinungen von Incarceration des re- troflectierten gravid. Uterus, die lebensbe- drohlich wurden.		† 22.2.90 unter Col- laps. (wahr- scheinlich an chron. verlau- fener Tu- bericuli- tis)

Name des Operateurs bezw. Refr.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
192. Heft 29 u. 30. 31.			manusfaustgrosses Myom. Unterhalb des- selben an der hinteren Fläche des Uterus breitbasig aufsitzend ein drittes, halb- hühnereigross. Myom; ausserdem einige kleine, bohnen-grosse, subseröse Myome.		intacte Ei sich in dem abgetragenen Teile befindet. Hierauf Aus- schneiden der Deci- duareste u. Cervical- schleimhaut. Aus- brennung mit dem Paquelin. Extraperit. Stielversorgung.		
Egon v. Braun. op. (Geb.-gyn. Ges. zu Wien.) Sitzung 11. 2. 90).		3.	Multiple Fibrome.		Extraperit. Behand- lung des Stiels.	Foet. in Bek- ken- end- lage.	Starke Compres- sion des Foetus durch den Tumor.
32. Kaschkaroff, op. 9. 8. 1890. (Centralbl. f. Gyn. 1890. Sitzungsbe- richt für Geb. u. Gyn. Berlin 24. 10. 1890.) 33.	40 J. 13 p.	5.	Fibroma subserosum.	Die letzte Entbindung vor 7 Jahren. 2 Mon. nach ihrer Entbin- dung kam P. wegen Blutungen.	Nach dem Schnitt am Uterus entleerte sich eine ungeheure Menge grünlichen, stinkenden Frucht- wassers. Gummi- schnur ums Collum. Wegschneiden des grössten Teiles des Uterus u. Adnexen. Nach Abnahme der Gummischnur	Hei- lung.	Keine Tempera- turersteigerung in der Rekonvales- cenz.

Lalin, op. (Ett. fall af ett interligam. utvecklade myom för trängande störra delen af lilla bäckenet komplic. med gravidit. Exstirpat.	44 J. 7 p.	1.—2. Rechte Hälfte der Beckenhöhle durch einen Tumor ausgefüllt, der den Uterus nach links vorne verdrängt.	Letzte Geburt vor 5 Jahren.	Die Ausschalung des Tumors schwierig. Der Uterus musste mit entfernt werden. Er wurde gerade oberhalb d. Os intern. amputiert, Stumpf vernäht u. versenkt.	Heilung.	Bei einer 13 Mon. nach der Operation gemachten Untersuch. wurde im Muttermund ein Seidenfaden entdeckt. Durch Zug die ganze oberhalb der Ligatur gelegene Partie mit sämtlichen Seidennähten entfernt. Keine Reaktion vor oder nach diesem Eingriff. Da kein Verdacht auf Schwangersch. bestand, wurde vor der Operation zur Konstatierung der Lage des letzteren die Sonde eingeführt. Die Operation wurde
--	-----------------------	---	------------------------------------	---	-----------------	--

[Svenska Läkare-Sälls-Kapets Förhandlingar, pag. 44 bis 49. Hygiea, 1891. Bd. 53. Nro. 4.]

Name des Operateurs bezw. Refr.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Sutton, op- (Suton. Stans- berg, Preg- nancy and Fib- roma. The Cincinnati. Lan- cet-Clinic, 1891, pag. 9) 35.		5.	Myom des Fund. uter.		Amput. supravagin.	Hei- lung.	verschoben wegen Phlegm. alb. dol. am rechten Bein. Später wurde die Gravidit. erkannt an der wahge- nommenen Ver- grösserung des Uterus u. öfteren Contraction des- selben bei Palpa- tionen. Glücklicher Ver- lauf.
Hauser, Refr. (Arch. f. Gyn. Bd. XLII. 1891. Heft 1 u. 2: Zur Casuistik der supravag. Amput. des schwangeren myomatös. de-	36 J. 1 p.	3.	Die exstirpierte Ge- schwulstmasse ist im Ganzen über manns- kopfgross, sie wog im frischen Zustand (+ Uterus, aber ohne Ei) 2800 gr. Sie be- steht aus zahlreichen, haselnussgrossen bis	Indication: schnelles Wachstum der Tu- moren.	Schnitt in der Mittel- linie: Peritoneum mit d. Bauchdecken ver- näht. Mit geringer Mühe werden die Tu- moren aus d. Bauch- wunde hervorgewälzt, wobei auch der im kleinen Becken ge-	Hei- lung.	30. 11. geheilt entlassen.

nanten Tumoren, die
 dem ziemlich central
 gelegenen, etwa faust-
 grossen Uterus auf-
 sitzen. Die einzelnen
 Myome sind theils
 interstitiell, theils
 subperit. entwickelt.
 Die vordere Wand
 des Uter. ist ver-
 dickt durch ein klein-
 faustgross. interst.
 Myom. Es sitzt ihm
 ausserdem noch breit-
 basig ein im Ganzen
 überkindskopfgrosses
 Fibroid auf. Dieser
 Tumor ist mit einem
 knolligen Fortsatze
 theilweise zwischen die
 beiden Blätter des
 rechten Lig. lat. hin-
 eingewachsen. Vom
 untersten Theil der
 vorder. Wand d. Uter.
 entspringt noch ein et-
 was gleichgross. breit-
 basiger Tumor, theil-
 weise nach links zwis-
 chen die beiden Blät-
 ter des linken Lig. lat.
 hinein entwickelt. Im
 rechten Lig. lat., voll-
 ständig intraligamen-
 tär, ein weiterer breit-
 basiger Tumor von

doch dabei stark ge-
 zerrt, sodass der Stiel
 zum Theil einreissst u.
 eine ansehnliche Blu-
 tung entsteht. Diese
 wird durch eine Klam-
 mer gestillt. Nun
 wird die Blase vorn
 stumpf u. quer abge-
 löst, sodann das Lig.
 lat. mit Seidennähten
 abgebunden u. zum
 Theil abgetragen.
 Schlauch umgelegt,
 geknotet und über
 denselben werden 3
 Muzeauxschézangen
 eingehackt, um das
 Abgleiten zu verhin-
 dern. Quere Abtren-
 nung des Tumors.
 Keine Blutung. Die
 Cervicalhöhle wird
 trichterförmig ausge-
 schnitten und mit
 dem Paquelinsehen
 Brenner verschorft.
 Dann Etagennähte:
 Die tiefen nur den
 Cervicalstumpf ohne
 das Periton. fassen-
 den mit Seide; über
 diesen Stumpf wird
 das Peritoneum für
 sich mit Catgut ver-

Name des Operateurs bezw. Refr.	Alter der Frauen Wie- vielte Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Ehrendorfer, (Innsbruck.) Amput. des Uter. wegen Fibronyome	41 J. 11 p.	4.	Kleinf Faustgrösse Auf der hinteren Wand des Uterus 2 faustgrosse Myome, beide mehr am un- teren Teile desselben und breit aufstehend. Auch am Fundus 2 se- röse, gestielte Fi- broide; das eine von Wallnussgrösse mit dickem Stiel, das an- dere grösser und wal- zenförmig. Ausser diesen 8 grö- seren noch mehrere haselnuss- b. walnuss- grosse subperit. My- ome. Sämtlich sind sie hart, ohne cystische Erweichung oder an- derweitige anatom. Veränderungen. 2-mannskopfgrosses Fibrom von brotaib- artiger Form, aus- gehend von der vor- deren Wand und zum Teil vom Fundus des	1. Abort im 2. Lunar- monat. früher	einigt, nachdem der Schlauch gelöst und die Blutung noch ganz gestillt worden ist. Die Blase wird durch einige Catguträhte mit der vorderen Wand des Stumpfes vernäht. Zuletzt werden die bei der Abtragung der Ge- schwulst eröffneten Lig. lata mittelst Catgut geschlossen. Reinigung d. Bauch- höhle mit schwacher Sublimatlösung. Der Stiel wird verseukt Verschliessung der Bauchwunde durch tiefe u. oberflächliche Seidennähte.	Hei- lung.	Leichte Phlebitis des linken Beines.

Frucht. Inter-
nat.klin.Rund-
schau 1892.
Heft 29 u. 30).

37. Ter-

Mikaelianz,
(Ref. zur Frage
der Coincidenz
von Myom und
Schwanger-
schaft und der
Therapie in der
ersten Schwän-
gerschafts-
hälfte:

Wratsch 1892,
pag. 472—492.
Besprochen in

Frommels
Jahresbericht
1891 op. Phae-
nomenoff 6. 5.
1890).
38.

v. Rosthorn

(Prag) op. 5.
2.1892. (Wien.
klin. Woch.
1893. No. 41.,
zur retroperi-
tonealen Stiel-
versorgung

32 J.

Keine
Regel
seit 15.
3.1890;
also im
2. Mon.

Ein kindskopfgrosses,
intraparietales Myom
vorne und ein sub-
seröses von der Grösse
einer monatl. Frucht;
die übrigen Tumoren
kleiner. ein apfel-
grosser an d. hinteren
Wand d. Cervix rechts
seitlich, intraliga-
mentär.

39 J.

An-
fang d.
3. Mon.

Multiple subseröse u.
intranurales Myom.
Das ganze Abdomen
war von einer knol-
ligen, sehr derben Ge-
schwulstmasse ausge-
füllt. Mehrere hühner-
eigrosse Tumoren. Ein

Die einfache Gastro-
myotomie war hier
wegen der multiplen
u. intraligamentären
Myome nicht möglich.

Seitliche Durchtren-
nung d. Liggl. lata, dann
Schlauch. Schnitt auf
den Tumor im Uterus,
um ihn zu entfernen.
Bei Eröffnung des
Cavum uteri wölbte
sich das Ei etwas vor,
das oben mit dem Uter.
in Zusammenhang
stand. 10% Carbol;
dann trichterförmige
Ausschneidung der
Mucosa so weit zu-
gänglich, 4 Etagen
kurz abgeschnittener
Seidennähte auf den
Stumpf und dann erst
Bauchfell darüber ver-
einigt mit Einwärts-
rollung der Ränder.

Seit 2 Monat. Cessatio
mensium, Schmerzen,
Druckgefühl, Obsti-
pation.
Wachstum der Tu-
moren, erhebliche
Anämie infolge sel-
tener, aber schwerer

Hei-
lung.

Fieberlose
Heilung.

Hei-
lung.

Bis auf eine am
6. Tage aufge-
tretene, von einer
Bronchitis her-
rührende Tem-
peratursteigerung
vollkommen afe-
briler Verlauf. P.

Name des Opérateurs bezw. Refer.	Alter der Frauen. Wie- vielte Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung. Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
bei Myomat. nach Chrobak; Prag. med. Woch. 1893, 10. 39.			4750 gr. schweres, subseröses Myofibrom, von einem handteller- grossen Stiel von der hinteren Wand aus- gehend.	Hämorrhag. Ascites. Cyanose der äusseren Genitalien.	Embryo wird heraus- geschwemmt. Sonst- typische Operation. Retroperitoneale Stielversorgung nach Chrobak.		verlässt a. 14. Tag das Bett. Die Schwanger- schaft war trotz Sondierens nicht erkannt worden. Conception trotz bestehender se- cundärer Endo- metritis.
v. Rosthorn, (wie oben), op. 40.	39 J. Nullip.	3.	30 kg schwerer Tu- mor: Multiple intra- murale Myome und ein kindskopfgrosses My- om der hinteren Wand des Collum, ins Bek- kenzellgewebe hinein- gewachsen.	Seit 3 Monaten Ces- satio mensium. Seit dieser Zeit ein Tumor in der rechten Unter- bauchgegend bemerk- lich.	Retroperitoneale Stielversorgung nach Chrobak. Der kind- skopfgrosse Tumor musste aus dem Bek- kenzellgewebe aus- geschält werden. Ge- naue Vereinigung des entstandenen Spalt- raums im Peritoneum.	Hei- lung.	14 Tage p. o. Ent- lassung. Mässige Infiltration neben dem Cervixstumpf, die auf warme Sitz- bäder zurückgeht.
Lanvers (Gros- sese et my- oms utérins. Soc. Belge de Gyn. Ann. de gyn. et d'obst. 1892, Avril, pag. 141. cit. nach Frommels Fetterschneide)					Supravaginale Am- putation des Uterus mit extraperitonealer Stielversorgung.	Hei- lung.	

Lanelongue,
op. (Tumeur
fibreuse deve-
loppée rapide-
ment sous l'in-
fluence d'une
grossesse.
Nouv. arch. de
l'obst. et de
gyn. 1892. No.
10. pag. 449).

Kloiz, op.
(Demonstration
eines 23 Woch.
graviden

Uterus m. ein.
3-kindkopf-
grossen Cervix-
fibroid. Gyn.
Gesellschaft in
Dresden,

10. Nov. 1892;
ref. Centralbl.
f. Gyn. pag. 73).
43.

3.

27 J.
Nullip.

Menses seit 3 Monaten
ausgeblieben. Rapide
Zunahme des Unter-
leibs. Wegen Kräfte-
verfall Myomotomie.

Supravag. Amputat.
des Uterus.

Hei-
lung.

23 Wo-
chen.

Oedematöses, 2 kinds-
kopfgrosses Cervix-
fibroid, das das Becken
ausfüllte.

Vor 12 Jahren Früh-
geburt im 7. Monat.
Eine normale Geburt.
Unerträgliche Com-
pressionserscheinun-
gen.

Hysteromyonectomie.
Chrobaksche Me-
thode.

Hei-
lung.

Nach Verlauf von
10 Tagen p. o.
fieberfrei, ohne
alle Beschwerden.

Name des Operateurs bzw. Refer.	Alter der Frau, wie viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung, Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
v. Rosthorn (Prag), op. (Prag med. Woch. 1893. No. 10).		4.	Rechtsseitiges, intraligamentäres Fibromyoma uteri von über Manneskopfgrosse.	Ehorm rasch. Wachstum.	Amput. colli uteri suprav. mit retroperiton. Stielversorgung nach Chroback.	Heilung.	
44. Chroback, op. 5. 5. 92. (Geb.-gyn. Ges. Wien. 21. 2. 93 im C. f. Gyn. 1893).	37 J.	6.	5 Pfd. schwerer, necrotischer Tumor am Fundus der Gebärmutter mit cystischer Degeneration, stark fluktuierend.	Heftige Atembeschwerden und Befürchtung einer Ruptura uteri.	Amp. uteri supravag.	Heilung.	6 Mon. alte, lange lebend Frucht im Cavum uteri.
45. Fehling (Basel), op. 31. 1. 93.	33 J. 4 p.	3.—4. Mon.	Myoma uteri interstiale et subserosum.	1. Geb. 1880. Kind lebt. 2. Geb. eine Fehlgeb. im 3. Monat (1885). 3. Geb. normal. 1886. Kind lebt. Wachstum des Tumors Atmungsbeschwerd.	Amp. ut grav. myom. suprav. Extraper. Stumpfversorgung.	Heilung.	Näheres Krankengesch. II.
46. Fehling (Basel), op. Februar 1894.	27 J. 1 p.	Mensis seit 6 Wochen ausgeblieben	Multiple, subseröse Myome u. grösseres subseröses, gestieltes von der rechten, vorderen Kante d. Uterus ausgehendes Myom, dessen Stiel gedreht	Rasches Wachstum der grösseren Geschwulst. Peritonitische Symptome inf. Stieldrehung.	Amp. ut. suprav. Intraper. Stumpfversorgung.	Heilung.	Näheres Krankengesch. III.

Nové Josseland (Lyon). (Lyon méd. 1893. Aug. 20. Besprechen im Centralbl.f. Gyn. 1894. No. 16). 48. Banga, Henri (The Newy. Journ. of Gyn. and Obst. issued monthly; Transact. of the Chicago Gynecolog. Society, Meeting of January 19, 1894), op. 17. 11. 1893. 49. Döderlein, op. (C.f. Gyn. 1894. No. 27. Sitzungsber. d. Ges. f. Geb. Leipzig 424. Sitzung 19. 2. 1894). 50. Price, M. (Ann. of gynec. a. paed. 1892. Bd. 6, No 1, pag. 59). 51.	4 Woch.	Colossambroid, in dem der Foetus.	36 J. 4.—5.	Letzte Menstruation: letzte Woche des Juli 1893.	Amp. ut. grav. myom supravag. Extraperitoneal-Methode.	Heilung.	Foetus 4¹/₂ Woch. alt.	Unnötige Amputation!	Verlauf ohne jegliche Reaktion: (Dieser Fall ausführlich veröffentlicht in einer im Druck erschienenen Dissertation von H. Cordes, Leipzig. G. Fock 1894).
				Indication: heft., zunehmende Schmerzen.	Intraperitoneale Stielversorgung nach Zweifel.	Heilung.			
		Grosses breitbasiges, dem Uterus aufsitzendes Fibroid. Der Uterus ist bis zum Cervix mit Fibromknoten besetzt.	31 J, 1 p. 3.	Abdomen wie im 6. Monat ausgedehnt. Peritonitische Erscheinungen.	Hystectomie.	Heilung.	Kind war abgestorben.		

Name des Opérateurs bezw. Refr.	Alter der Frauen Wie- vielte Geburt.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatomische Beschaffenheit des Tumors.	Frühere Entbindung. Indication, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Reamy, Th. A., (Ann. of gyn. a. paed., Dez. 1893. Bd. 7, pag. 152). 52.	30 J.	?	Bis quer über den Nabel reichender, re- trouteriner Tumor.	Bis vor 2 Monaten gesund, bemerkte Patient zuerst vor einem Jahr in der rechten Seite des Ab- domens eine faust- grosse Geschwulst, später eine links- seitige. Seit 4 Mon. schnelles Wachstum derselben. Unterleibs- schmerzen, Fluor albus, Blasenbe- schwerden. Abdomen wie im 4. Mon. aus- gedehnt. Cervix auf- fällig weich. Keine Herztöne.	Enucleation der Tu- mors, dann Abtragung des Uterus, da die Wundfläche zu gross, die Blutung aus der- selben zu stark war. Intraperitoneale Stiel- behandlung.	Hei- lung.	
Koss, J. F. W. (The Am. Journ. of obst. March. Bd. 27, pag. 367). 53.	41 J. 2 p.	5.	Von der linken Seite des Uterus ausgehen- des, bis unter die Rippen reichendes Myom.		Abdominale Exstir- pation des Uterus u. Tumors.	+ 4 Woch. p. o. an Ileus infolge Ver- wachsung einer Darm- schlinge mit der Bauch- narbe. + 3 Tag. p. o. an Perito- nitis.	Zuerst glatte Hei- lung.
Vautrin. (Congrès français de	33 J.	4.	Fibrom im Douglas.	Compressions- u. pel- veoperitonitische Er- scheinung.			

Heilung.

NOUV. ART. d'obst. et de Gyn. Supplément Nro. 4. pag. 188). 54. Bidder. (Journ. f. Geb. u. Fr., Petersburg 1889, II. cit. nach Apfelstedt. Arch. f. Gyn. Bd. 48. 1894). 55.

Die Indication zum Eingreifen gaben:

1. meist multiple, bisweilen intraligamentäre, breitbasige und interstitielle Geschwülste, die infolge der allgemeinen Wachstumsvorgänge während der Schwangerschaft auch ihrerseits eine Vergrößerung erfahren haben, meist derart, dass gefährliche Druckerscheinungen von seiten der Brust- und Bauchorgane entstanden. In anderen Fällen erfolgte eine Reizung des Peritoneums, so dass ein Peritonitis mit ihren quälenden Symptomen eintrat. Dies geschah in 11 Fällen, einmal infolge Stieldrehung der Geschwulst. In einigen Fällen führten Blutungen zu hochgradiger Anaemie;

2. 1 mal war Verhinderung erneuter Conception bezweckt;

3. 1 mal heftige Schmerzen (!);

4. 1 mal Kräfteverfall [neben rascher Zunahme der Geschwulst];

5. 1 mal die drohende Durchreissung der Gebärmutter (neben grosser Atemnoth);

6. 1 mal Unmöglichkeit der Beendigung des eingetretenen Aborts wegen Grösse und Sitz der Geschwulst;

7. 1 mal wegen höchst bedenklicher Incarcerationserscheinungen.

Die Geschwülste waren:

1 mal torquiert;

1 mal eingekeilt;

1 mal necrotisch und cystisch; .

1 mal gangränös infolge Drucks gegen das Os sacrum

1 mal erweicht und teilweise zerfallen;

1 mal cystisch und im Zerfall begriffen;

2 mal cystisch erweicht;

5 mal auffallend weich infolge starker oedematöser Durchtränkung.

Das Alter der Operierten belief sich im Mittel auf 34,95 Lebensjahre (Minimum: 25- Maximum: 47 Jahre).

In 30 Fällen handelte es sich, was die Zahl der vorausgegangenen Geburten anlangt:

15 mal um I pp. (= 50%).

10 mal um II pp. (6 mal Frühgeburten des 2.—4. Monats)
[= 33,3%].

5 mal um Mpp. [= 16,7%].

1 mal III p. (Vor 12 Jahren Frühgeburt, im 7. Monat normale Geburt).

1 mal IV p. (1. und 3. Geburt normal, 2. Geburt: Abort im 3. Monat).

1 mal VI p.

1 mal VII p. (letzte Geburt vor 5 Jahren).

1 mal VIII p. („ „ „ 7 Jahren).

Die Durchschnittszeit der Schwangerschaft, zu der die Operationen ausgeführt wurden, fällt in die Zeit zwischen 3. und 4. Schwangerschaftsmonat (Minimum 1.—Maximum 5. Monat). Bei I pp. liegt jedoch die Durchschnittszeit näher dem 3. Monate. Dies mag wohl darin seinen Grund haben, dass diese die Beschwerden, die durch die Spannung infolge der wachsenden Geschwulst und gleichzeitiger Schwangerschaft hervorgebracht werden, natürlich viel früher und viel empfindlicher (meist ältere Erstgebärende) spüren und deshalb eher an den Arzt um Abhilfe sich wenden als Mpp., deren Bauchdecken durch die früheren Geburten, besonders wenn das normale Ende der Schwangerschaft schon einmal erreicht worden, bereits schon einmal eine Dehnung erfahren haben.

Über den Erfolg der Operation ist

1 mal nichts angegeben;

40 mal erfolgte Heilung (bezw. 43 mal mit dem Frommel'schen Passus);

14 mal der Tod.

Die Mortalität der Operierten beträgt also bei der Amputatio uteri myomatosis et gravidit. supravaginalis 26% (bezw. 24,14%).

Die Ursachen der 14 Todesfälle waren:

8 mal unzweifelhafte Sepsis (Tod 49 Stunden — 11 Tagen p. o.) bezw. Peritonitis, welche letztere in 3 Fällen

schon vor der Operation vorhanden war;

1 mal zweifelhafte Sepsis (Tod 64 Tage p. o. unter Erbrechen und Collaps);

Erbrechen und Collaps);

1 mal Ileus (4 Wochen p. o. Zuerst glatte Heilung!);

1 mal Collaps (23 Tage p. o.; chron. verlaufene Peritonitis?);

2 mal nichts angegeben (26 Stunden bzw. 11 Tage p. o.

1 mal Peritonitis intra operationem).

Die extraperitoneale Stielbehandlung wurde in 22 Fällen ausgeführt, und zwar mit:

16 Heilungen;

5 Todesfällen (2 mal Sepsis, 1 mal Sepsis zweifelhaft);

1 mal nichts angegeben.

Mortalität der Operation bei extraperitonealen Verfahren: 23,81% (bzw. 21,74%).

Die intraperitoneale Methode der Stumpfbehandlung kam in 14 Fällen zur Anwendung; mit ihr wurden erzielt:

10 Heilungen;

4 Todesfälle (3 mal Sepsis; 1 mal Peritonitis).

Mithin beträgt die Mortalität der Operation bei intraperitonealem Verfahren 28,57%. In 5 Fällen kam das Chrobak'sche sogenannte retroperitoneale Verfahren zur Anwendung und zwar durchweg mit dem besten Erfolg.

Von Einzelheiten wäre zu erwähnen:

1. Die Diagnose der Complication ist

a) in 5 Fällen gar nicht gestellt worden (1 mal handelte es sich um Zwillinge + Hydramnion + Tumor),

b) in 1 Fall zuerst ebenfalls nicht, sodass es zur Einführung einer Sonde kam,

c) in 1 Fall wurde die Diagnose auf Ovarialtumor und Schwangerschaft gestellt; in Wirklichkeit:

Fibroid + Hydramnion + Zwillinge.

2. Der Amputation wurden vorausgeschickt

a) 1 mal künstl. Abort wegen Retroflexio uteri,

b) 2 mal Probeincisionen in den Tumor.

3. In 3 Fällen war die einfache Myomotomie mit Zurücklassung des Uterus beabsichtigt; aber Amputatio uteri:

a) wegen interstitiellen Sitzes des Tumors;

b) wegen Multiplicität der Geschwülste;

c) wegen des breitbasigen, intraligamentären und retroperitonealen Sitzes des Geschwulst.

4. In 4 Fällen wurde die Myomotomie vorausgeschickt, dann aber die Amputation angeschlossen:

a) wegen unstillbarer Blutung aus dem Grunde der abgetragenen Geschwulst;

b) wegen der vielen Insulte, die der Uterus bei der schwierigen Operation erlitten;

c) Grundnichtgenannt(Diagnosevorhernichtgestellt!);

d) wegen Entstehung einer zu grossen Wundfläche und zu starker Blutung aus derselben.

5. In 1 Fall fiel ein kleines Myom in die Abtragungsfläche ohne weitere Folgen (extrap.).

6. In 1 Fall ziemlich starke Compression des kindlichen Körpers durch die Geschwulst.

7. In 1 Fall Insertion der Geschwulst auf der Placenta.

8. In 3 Fällen Steisslagen.

IV. Kaiserschnitte. (Tabelle 4a und 4b.)

Die Weiterführung der Säger'schen Statistik vom Jahre 1882 an (vgl. Säger's „der Kaiserschnitt bei Uterus-fibromen“ in der Festschrift zum Jubiläum Crede's) bis in die neuste Zeit hinein ergiebt 20 weitere konservative und 30 Kaiserschnitte nach Porro bei Myomen des Uterus. Rechnet man die 3 von Säger (l. c.) angeführten Fälle von Tarnier, Zweifel und Agnew hinzu, so sind überhaupt bis heute 33 Kaiserschnitte nach Porro bei Myomen der Gebärmutter gemacht worden, so weit ich die Litteratur überschauen konnte.

Tabelle IV^a.

Konservative Kaiserschnitte wegen Myomen des Uterus.

Name des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund. Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für	Bemerkungen.	
						Mutter	Kind	
O. Beumer, op. (D. med. Woch. 1882. No. 40). Arch. f. Gyn. Bd. XX. Heft 3. 1.	40 J. 1 p.	9.	Kleinkindsgrosses, in- tramurales Fibroma der hinteren Cervix- wand, das durch alte Adhäsionen im Doug- las'schen Raum fixirt, den Beckeneingang gänzlich verlegt, un- verschiebbar.	Abfluss des Frucht- wassers 4 Tage nach Eintritt der Wehen; gleich darauf: Opera- tion. Vor letzterer wurde der Tumor mit starken Troicart v. d. Vagina auspunktiert. Das Orific. ext. offen. Die Cervix hat eine Länge von 8—10 cm und ist bis zum Os uteri mit Mühe zu passieren. Die mässig ernährte Frau leid. an Cystitis und Pyleonephritis.	Am ob. Schnittende des Uterus wird auf 2 cm Länge die Pla- centa getroffen. Die starke Blutung sistiert sofort nach Zuziehen des Schlauch- es. Keine Spur von Contraction. Uterus- nach Saengersub- periton. Uterusrese- ction, 7 tiefgreifende Suturen, ohne die Decidua mitzufassen. 4 oberflächliche serös. Seidensuturen. Schluss der Bauch- wunde. Schnelle Be- endigung der Operat. war erwünscht.	† 36 h. o. p.	† lebend 50 cm lang. 3089 gr.	Bei der Toilette der Bauchhöhle glitt d. 4. Schwamm vom Halter ab, die Därme mussten zur Auffindung desselben heraus genommen wer- den.
Münster op. 1883. (C. f. Gyn. 1886. X). 2.	32 J. 1 p.		Retrovaginal ge- legener, unbeweg- licher, elast. weicher Tumor von unregelmässiger Oberfläche, die ganze Kreuzbein-	3 tages Abfluss des Fruchtwassers vor 10 Stunden. Bei der Punction des Tumors entleerte sich eine geringe	Kaiserschnitt nach Sänger. Der Uterus zeigte sich von zahl- reichen reichlich wall- nuss grossen Knoten durchsetzt. Aus dem	† 4 Tage p. o. an Aspyk- tisch; erfolg- los Peri- tonitis.	Wie-	

Leopold, op. 1885. (Der Kaiserschnitt und seine Stel- lung etc. Stutt- gart. 1888). 3.	33 J. 6 p.	Intraligamentär ent- wickeltes links- seitiges Uterusmyom, das den Beckenein- gang verlegt. 5 Früh- geburten (sämtlich tot) von 7—10 Monat.	Geburtsdauer: 16 h. 55!) Blasensprung 2 Min. vor der Opera- tion. Muttermund bis 5—6 cm erweitert. Befinden bis zur Operation gut.	Stiefe Silber-, 24 ober- flächliche Seidennähte 5 Umstechungs- nähte. Operations- dauer: 1 h. 20.	Hei- lung.	lebend 48 cm. 2830 gr.	P. stand am 14. Tg. p. o. auf. Entlas- sung am 34. Tage. Befinden nach 7 Monaten sehr gut, Menstruation re- gelmässig. Uterus rechts seit- lich oben i. grossen Becken. D. Drähte sind sehr leicht zu fühlen als dicke, knollige Leisten, unter denen der Uterus schmerz- haft.
Weist, (New- York med. rec. Marsch. 13. 3. 1886. p. 301.) 4.		Fibroma cervic. uter. die ganze Becken- höhle einnehmend.	Kaiserschnitt nach Sänger.		+ 24 h. p. o.	Leben- des Kind.	

Name des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund, Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Paradis, (Journ. de méd. de Bruxelles, April 1886).			Fibromyome des Uterus.		Kaiserschnitt m. Naht des Uterus.	†	
Eichholz, op. (Frauenarzt 1887, Heft 5).	30 J. 3 p.		Myom der Cervix von der vorderen Wand ansgehend.	15 Stunden vor der Operation Beginn der Geburt.	Sectio caesarea, Elast. Constrict. Tiefe und oberflächliche Seiden- nähte.	† 3 Tage des p. o. in- folge Sepsis.	Während der Ope- ration Collaps. Des- halb wurde von der Entfernung d. Myoms abgesehen und die Uterin- wunde geschlos- sen. 2 Tage nach- her wurde das ver- jauchende Myom in der Schamspalte sichtbar.
Drysdale, op. (Americ. med. News: Nov. 1887).			Eingeklemmtes Fibrom.	Die P. kreisste während d. Operation.	Kaiserschnitt mit Uterusnaht. Zurück- lassung d. Geschwulst.	† einige Stun- den p. o.	
Bailey, op. (The Lancet, 12. 5. 1888 in Frommels Jahrb. 1887).			Myoma uteri.		Konservativer Kaiser- schnitt.	† 4 Tage des p. o. Kind.	
C. v. Braun, op. (Wien med. Blätter 11. 50.			Incarceration eines kindskopfgrossen irreponiblen Collum-		Konservativer Kaiser- schnitt.	Hei- lung. des Kind.	

trahl. f. Gyn. Sitzungsber. der Geb.-gyn. Ges. Wien vom 10. 7. 1888. Braun v. Fern- nald, E. und Herzfeld, K., d. Kaiserschnitt etc. Wien 1888. A. Hoelder).	32 J. 2 p.	7.	2 Jahre vorher Abort im 3. Mon. Ausfüllung des kleinen Beckens u. d. Beckenschaukeln mit unarten knolligen (geschwülsten. Die Masse der vielen Fi- brome etwa v. Manns- kopfgrosse u. 2600 gr. Gewicht hatte sich grösstenteilsinsrechte Ligg. lat. hineinzu- wickelt und war fast völlig unbeweglich.	Klagen über heftige Schmerzen, Übelbe- finden, das immer schlechter wird. Be- schwerden beim Ge- hen. Heftige Schmerzen, besonders des Nachts. Appetit- losigkeit. Kräftever- lust. Abmagerung. Temperatur 38°. Urin eiterhaltig.	Glatte Operation. 9 tief Seiden- 9 ober- flächliche Catgut- nähte am Uterus. Un- terbindung d. Tuben, da die vollständigen Adhexe nicht z. fassen.	+ 1 Tag p. o. in- folge Py- elone- phritis (Tuf- fier: in- folge Druk- kes des rechts- seitig. interli- gament Tu- mors auf den Ureter)	Leben- des Kind.	Chock, Blutung u. Sepsis sind als Todesursachen vollkommen aus- zuschliessen. Gleich nach d. Ope- ration Wohlbefin- den. Abends Tem- peratur 37,6. Puls 124. Weder Blu- tung, Erbrechen, noch Schmerzen. Autopsie: Rechter Ureter auf 1 cm Durchmesser er- weitert, d. Nieren- becken erweitert und mit Eiter- gefüllt. Der Zustand blieb derselbe wie vor der Operation. Die Autopsie ergab: intensive paren-
7. J. 30 J.	7.	Weiches, die ganze Bauchhöhle aus- füllendes Myoma colli uteri, so dass d. Uterus hoch oben links unter dem Rippenbogen lag.	Heftige, tinkende Diarrhoe (woher?) Anurie, Albuminurie. Wehen mit Abgang von Fruchtwasser.	Sectio caesarea.		+ 36 h. p. o. Uramie	Leben- des Kind.	

Name des Operateurs bzw. Refer. Quelle.	Alter der Frauen. Wieviele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffenheit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund, Blasenprung, Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
bördshus, Hygica Bd. 51, 1889, No. 12. p. 729, cit. nach Frommels Jahresb. 1889) Gothenburg. 11.							chymatische Nephritis.
Everke (Buchum) op. (D. med. Woch. 16. 29. 1890) 10. 3. 1889. 12.	36 J. 5 p.		Retrocervic pralles Myom in der Beckenmitte drängte das rechte Scheidengewölbe herab und bewirkte solche Verengerung, dass die Entwicklung selbst des verkleinerten Kindes unmöglich war.	2 tägiges Kreissen. Sehr starke Wehen. Blasenprung 9 h. nach Beginn der Wehen. Zangenversuche. Probeincision des Tumors.	Kaiserschnitt nach Sänger. Nach der Operation gelang es von der Scheide aus mit Benutzung der Probeincisionswunde den m. Muzeauxscher Zange herabgezogenen Tumor mit dem Finger in toto auszuschälen.	Heilung. Lebend.	In den ersten Tagen Temperatursteigerung von 38—39°. Puls 120—140. Baldige Besserung. Nach 4 Wochen geheilt entlassen.
Gibb, op. (Labor, complic. by a fibrotumor, caesarean section. Med. News. Philad. 1890. 6. 333. Nch. Frommels Jahresber. 1890).	35 J. 1 p.		Becken ausgefüllt durch ein hartes, kurz u. dick gestielt von der hintern Wand des Uterus ausgehendes, im Becken adhärenthes Myom, 2 Pfd. schwer.	Geburt schon seit 48 Stunden im Gange.	Nachdem die Uteruswunde geschlossen war, liess sich der Tumor enporheben. Er wurde versorgt u. abgetragen, danach Banchschluss, nach dem heisses Wasser in die Bauchhöhle gegossen war.	+ 5 Tage as- p. o. an phyc- tisch. Endo-9 Pfd. metri- schwer Pel- veo- peri-	

bourne), op. (Austral. med. journ. XII. 4. p. 145. April 15. 1890, bespro- chen im C. f. Gyn. 1891). 14.	nicht gestieltes Fibrom. Die Tumoren sind incarcert und können nicht reponiert werden. Gleichzeitig besteht eine Retroflexio uterigravidi incompleta.	abfluss. Zustand der Frau bedenkl. Unmöglichkeit der Entbindung per vias natur. Ein Ellbogen im Muttermund.	Entwickelung d. Uterus aus den Bauchdecken; Kompression des unteren Segments mit d. Händen. Enorme Blutung. Der Kopf des Kindes lässt sich kaum aus der retroflectiert gewesenen Partie des Uter. herausziehen. Eines der Myome lag in der Schnittfläche. Deshalb macht auch die Vereinig. d. Schnittflächen des Uterus Schwierigkeiten. Zu diesem Behufe wird ein spindelförmiges Stück Musculatur excidiert. Uterusnaht Kängurusehne, Bauch mit Silber und Seide. Bauchfelltollette mit warmem Wasser. Cervix nicht drainiert.	p. Ö. starb wäh- rend d. Opera- tion.	Das Puerperium war durch Bluterguss neben den Uterus, Thrombose der einen unteren Extremität u. Lähmung
Salin (Stock- holm), op. 6. 8. 1890. (Tva med. fram- gang utförda kejsarsnitt. Hygiea, Bd. 52.	Myom, ausgehend mit einem däumdicken Stiel von der hinteren, unteren Wand des Uterus, fest verwachsen mit dem Beckenperitoneum, gross u.	Operation sofort nach Beginn der Wehen.	19 tiefe u. fast 40 seröse Nähre. Uterus atonisch, wurde durch Reiben erst nach bedeutendem Blutverlust zur Zusammenziehung gebracht.	Hei- lung des Kind. 3900gr Ge- deht vor- züglich	Leben- des Kind. 3900gr Ge- deht vor- züglich

N a m e des Operateurs bezw. Refer. Quelle.	Alter der Frauen. Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Enthindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund. Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter. Kind	Bemerkungen.
1890, Heft 12. Svenska Läka- resällsk. För- handl., pag. 240—441, be- sprochen in Frommels Jahresbericht 1890).			völlig unbeweglich den Beckeneingang verlegend.				der Harnblase et- was gestört. Erst 6 Wochen p. o. war P. fieberlos.
15. v. Ott, op. (Wratsch, St. Petersb. 1891. p. 221, 245: 3 Sectiones cae- sareae.	30 J. 1 p.		Im rechten Scheiden- gewölbe ist ein 2 faust- grosser Tumor zu fühlen. Er ist fast unbeweglich, ragt tief ins kleine Becken u. ist intraligamentär entwickelt, weshalb die Entfernung des Tumors unmöglich war.	2 Tage lang schwache Wehen; das Collum lässt den Finger nicht ein. Am 3. Tage starke Wehen. Ope- ration beschlossen. Entbindung p. v. n., auch mit Embryoto- mie unmöglich, weil der Tumor nicht ver- schieblich.	Tiefe u. oberflächliche Nähte. Ergotin. So- fort nach Schlauch- abnahme starke Blu- te. Massage ver- geblich, sodass der Tampon entfernt wur- de. 2 heisse Irriga- tionen. Druckverband.	Hei- lung. des Mäd- chen in Schä- del- lage.	Wochenbett 9 Tg. ohne Fieber, dann 2 Woch. subfebril. Keine Drucker- scheinungen von seiten d. Tumoren. 7 Mon. p. o. war der Tumor nur wenig verkleinert. Rectaldiastase in der Nabelgegend. Mutter und Kind am 39. Tage p. o. entlassen. Bei d. Entlassung war der Tumor etwas verkleinert, Puerperium nor- ma-
Orlow, op. (Wracz. 1892, p. 1281 (rus- sisch); in Frommels Jahresb. 1892) am 28.3. 1892.	36 J. 5 gr.		3 normale Geburten, die vierte im 7. Mon. vor 1 ¹ / ₂ Jahren. Ro- trocervicales Myom von Mannskopfgrösse.	Im 7. Schwanger- schaftsmonat wurde eine erfolglose Punk- tion gemacht vom hinteren Scheidenge- wölbe aus. Entbin- dung p. v. n. war unmöglich. In Be-	Konservativer Kaiser- schnitt u. Kaseration.	Hei- lung. Leben- den von Knabe 2840gr	

Picqué, op. (Gaz. des hôp. 1893. Nro. 37. im C. f. Gyn. 1893). 18.	37 J. 1 p.	Im rechten Horn des Uterus ein hühnerei- grosses Fibrom; fer- ner ein Fibrom der portio supravagina- lis colli, das die ganze Beckenhöhle ausfüllte. Reposition des letzteren unmög- lich.	Sectio caesarea. Der Uterus blieb zur In- cision und Naht in situ. Naht durch tiefe, die ganze Wan- dung des Uter. ausser der Mucosa fassende u. oberflächliche sero- seröse Nähte. Das Myom wurde zurück- gelassen.	Hei- lung.	Leben- des Kind in L. Quer- lage.	28 Tage p. o. Ent- lassung d. Mutter nach durchaus fieberfreiem Wo- chenbett. Gute Entwicklung des Kindes.
Wettergren, Karl (Arboga) Hygiea 1893. Bd. 55. Nro. 11. pag. 455—463 19.	36 J. 1 p.	Hochgradig allge- mein verengtes Bek- ken u. intraligamen- tär entwickeltes Cer- vixmyon.	Operation etwa 40 h. nach Beginn der Ge- burt; 17 Stunden nach Abgang des Fruchtwassers und nachdem vergebliche Zangenversuche von anderer Seite zu Hause vorangegangen	+ 4 Tage p. o. Nach- träg- licher Chloro- form- tod? Lun- genem- bolie?	Leben- des Kind.	2 Serosanähte hat- ten durchge- schnitten; Naht- linie ganz fest (alle Nähte von Seide), undurch- gängig. Wund- flächen nicht ver- klebt. Deutl. Zei- chen von Perito- nitis. Verfasser ist geneigt zu glau- ben, dass die To- desursache nicht Peritonitis, son- dern Chloroform- nachwirkung sei, ohne genügende

Name des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund, Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für		Bemerkungen.
						Mutter	Kind	
Coe (New-York), H. C. (Americ. J. o. Obst 1892. II., pag. 466) op. am 26. 7. 1893. 20.	35 J.		Fibroma Uteri.					Gründe für diese Anschauung an- führen zu können. Eine mikroskopi- sche Untersuchg. der Organe fehlt. Die Narcose dau- erte 2 Stunden; 125 gr Chloroform wurden ver- braucht. Das Cervixmyom mass 8 Mal 4 cm und war mit dem Uterus nur lose verbunden, lag völlig extraperi- toneal im Becken- zelligewebe.
						Hei- lung.	Leben- des Kind.	

Kaiserschnitt nach Porro wegen Myom des Uterus.

Tarnier. op. 1879 (Ann. de Gyn., Aug. 1879, Matéri- aux pour ser- vir à l'histoire de l'amput. utéro-ovarig- ne etc. Mémo- ire, A. Parent 1879. Berruti Fall 26. C. f. Gyn. 1879, 22).	33 J. 1 p.	9.	Das ganze kleine Becken durch einen wenig beweglichen fibrösen Tumor ausgefüllt, ein zweiter kleinerer an der linken Seite des Uterus.	7 Tage nach dem Blasensprung, nachdem man vergeblich auf das Emporsteigen des Uterus gewartet und die Frau schon schwer septisch erkrankt war.	„Antiseptische“ Operation nach Porro. Stiel bestehend aus dem Collum und der Kapsel des in jauchigem Zerfall begriffenen, teilweise ausgetödteten Fibroms.	+ 3 Ta- ge p. o. an 4500gr trid. Sepsis.	Verlauf in den ersten beiden Tagen günstig; dann Collaps, Fieber etc.
Zweifel, op. 1880 (Arch. f. Gyn. 17, 3).	37 J. 1 p.	7.	Das kleine Becken von einem hoch in die Bauchhöhle ragenden vielknotigen Fibrom erfüllt.		Operation nach Porro. Uterus aus d. Bauchhöhle herausgewälzt. Der Schnitt traf mehrere Geschwülste. Verkleinerung des enormen Stiels durch Excision.	+ 5 Ta- ge p. o. an Sep- tica- mie.	
Agnew, (Phi- lad.) op. 17. 8. 1880 (A. R. Simpson, Clin. lect. on a case of caesar. Hys- tero-Oöphor- ectomy, or Porros Operat. with Remarks, Brit. med.	?	?	?	?		+ +	

Name des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund, Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für		Bemerkungen.
						Mutter	Kind	
Journ. 1881. 11. Juni Nro. 1067 und ff. Simpson'sche Liste=No. 60. 3.								
L. Prochownik op. 1888. D. mod. Woch. 1882).	40 J. 1 p.	7.	Ein im kleinen Bek- ken eingekeiltes, kindskopfgroßes, harrtes, absolut unbewegliches Fibromyom, das sich in der basigen Fläche der hinteren Wand des Uterus inserierte, 2 apfel- große, von einander unabhängige gegen die Basis verschobene Fibromyome, an der Uterusfläche links und rechts durch die Bauchdecken zu palpieren.	Wegen hochgradiger Beschwerden und Unsicherheit in der Diagnose wurde der Uterus von den Bauchdecken aus punktiert. Abfluss von 1100 gr. Fruchtwasser. Am 4. Tage nach der Punktion geringer Fruchtwasserabfluss aus der Scheide und Eintritt gebulder Wehen. Versuche, Tags darauf Operation. Schwache Frau mit Zeichen v. Atheromatose der Gefäße. Temperatur vor der Operation etwas erhöht.	Operation nach Porro. Zuerst der Uterus scheinbar bis dicht über das Os int. abgetragen, dann Abtragung des Beckentumors, nachdem es mit grossen Mühen gelang; ihn durch combinirte Handgriffe emporzuwälzen. Nach Anlegung des Pannischen Drahtschülers unterhalb der Basis des Tumors wurde das noch übrig gebliebene Stück des Uterus abgetragen. Der Stiel ringsum nach Hegar mit Peritonäum umsäumt u. extraperitoneal befestigt. Keine Drainage des Douglas. Operationsdauer 1 3/4 h.	† 60 h. † zeigte p. o. an te für Sepsis. 2 Minuten		Da sich septische Erscheinungen 30 h. p. o. einstellten, wurde der Douglas eröffnet, mit Aq. chlor. ausgespült und drainiert, wobei sich blutige jauchige Flüssigkeit entleerte.

po. 1882. (Dys- tokie veran- lasst durch einen Tumor am Collum ute- ri, Arch. de Tocol. 1883. Juni. Lyon méd. Nro. 20 1882). 5.	füllend, irreponibel. Vor 2 Jahren die 15. Geburt ohne Kunst- hilfe.	Multiple Myome: 5 My- ome, 3 härtere von Wallnuss- bis Hühner- eigrösse, 2 weichere v. Doppelfaustgrösse im Zustand totaler Fettneurose.	Schwache, schliesslich keine Wehen am Ge- burtstermin. Aufhö- ren der Kindsbewe- gungen, Abgang von Meconium.	Wegen der multiplen Myome und weil die Eihöhle i. Zersetzung, Porro und nicht kon- servativ. Eines der Myome wurde durch den Uterusschnitt ge- spalten. Stumpf nach Hegar im unteren Wundwinkel fixiert.	† 2 1/2 Tage p. o. an Sepsis.	nach ein Myom gewesen. Vollständige Hei- lung nach 2 Mo- naten. Tumor et- was verkleinert, Gangränescenz des Stiels. Perfo- ration eines intra- peritonealen Abs- cesses nach aus- sen.
Sänger, op. 3. 3. 83. (Ein Fall von Porro- operation bei Missed labour und multiplen Myomen des Uterus. Cen- tralbl. f. Gyn. 1885). Arch. f. Gyn. Bd. 26. 1885). 6.	41 J. 1 p.	Multiple Myome, meist subserös, das grösste Myom orangengross, ausgehend von der hinteren Wand des Uterus, hineinragend ins Becken.	4 tägige Geburtsar- beit.	Eröffnung des Uterus, Unterbindung der beiden Parametrien. Später wird eine elas- tische Ligatur ums Collum gelegt. Extraperitoneale Stielversorgung.	† 24 h. † Foet p. o. abge- stor- ben. Collaps	Section, Blut in der Beckenhöhle. Eine Ligatur des linken Parametrium hatte sich gelöst.
Fibbi (Spoleto), op. (Porro. Ann. di obs- tetr. etc. 1885 Sept. - Oktob. 7.	32 J. 1 p.					

Name des Operators bezw. Refr. Quellr.	Alter der Frauen Wie- vielte Geburt.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer: bis zur Operation. Muttermund. Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Handfield Jo- nes, op. (Obst. transact. Vol. 27. 1885. 8.		Ausge- tragen.	Das kleine Becken durch ein von der hinteren unteren Hälfte des Uterus mit kur- zen, dickem Stiel aus- gebildetes Myom völlig ausgefüllt. Zwischen Tumor und Symphyse eine Passage von 2cm.		Kaiserschnitt nach Porro. Nach Eröffnung ge p. o. der Bauchhöhle und an Pe- Lösung der Adhäsio- ritoni- tis. nen des Tumors mit der rechten Becken- wand wurde ein Schlauch unterhalb des Tumors um das Collum gelegt. Uterus samt Anhängen ab- getragen.	+ 3 Ta- ge p. o. an Pe- ritoni- tis.	Über Behandlung des Stumpfes, so- wie Schicksal des Kindes ist nichts angegeben.
M. Hofmeier op. (D. med. Woch. Juli 1886). 9.	46 J. 1 p.	8 ?	Multiple Uterusmyo- me. Von der Mitte der hinteren Wand gehen von einem gemein- samen Stiel, der 2—3 Finger dick, 2 etwa 1 1/3 Faustgrosse, sehr harte, zum Teil regre- siv veränderte Myo- me aus, von denen das im Douglas lie- gende und allseitig verwachsene das Ge- burtshindernis bil- dete.	Das Fruchtwasser ging in der Nacht vor dem zur Ausführung der Operation fest- gestellten Tage ab. Der Allgemeinzustand der Patientin im hohen Grade elend, da sie, an sich von zarter Constitution, mehrere Monate bet-- tägerig war.	Amput. ut. in der ge- wöhnlichen Weise, ohne vorher die An- hänge unterbinden zu können. Vornähung des Stumpfes nach Ausschneidung der Cervixschleimhaut zunächst mit Catgut, dann einer unfaßenden Reihe von Seiden- knopfnähten. Zusam- menziehung des Peri- toneums mit Catgut- naht über den Stumpf. Versenkung dessel- ben. Es folgt die Aus-	Hei- lung. 5 Pfd.	P. verliess am 14. Tage das Bett und erfreut sich seit- dem einer zuneh- menden Gesund- heit. Das Kind nahm in den ersten beiden Wochen bereits 400 gr. zu. Fall von Madeira!

Klotz, op. (C. f. Gyn. 1887. Nro 22). 10.	31 J. 1 p.	Die obere Hälfte des klein. Beckens durch ein glattes, rundes, unbewegliches Fib- rom ausgefüllt. Es schien im Lig. lat. eingebettet zu sein u. liess sich nach rechts bis zur Crista ilei ab- tasten.	Die Wehen begannen 30. h. vor der Ope- ration. Hochstand der Cervix. Os uteri geschlossen. Kein Fruchtwasser abge- gangen.	Der Uterus liess sich wegen Fixation nicht herauswälzen. Nach Unterbindung d. Lig. lat. zeigt sich, dass der Tumor im Becken eingeklemt war. Ab- tragung nach Porro. Der Stumpf wird in die Bauchdecken ein- genäht. Minimaler Blutverlust. Opera- tionsdauer $\frac{3}{4}$ h.	† lebend Selbst-3750gr mord. 4 Tage p. o.	Am 4. Tage wurde die Bauchwunde wegen Erschei- nungen von Darm- einklemmung wie- der eröffnet u. der Darm gelöst. Bald sistierte das fae- cale Brechen. Pa- tientin strangu- lierte sich aber mittelst einer Schürze bei voll- kommen klarem Bewusstsein. Kei- ne Section.
Schroeder, op. 3. J. 1887. (Hofmeier, Ref. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 14. 1888). 11.	45 J. 3 p.	Zahlreiche Myomata uteri. Während der 2. Schwangerschaft 1885 leitete Schröder im 3. Monat den künstl. Abort ein, da durch Myome des mittleren Theils der rechten Cervixwand der ganze Cervix nach links hinüberge- drängt war u. wegen der Gefährlichkeit der Sectio caes. an sich. Jetzt schiebt sich ein	Wenige Stunden nach der plötzlichen Ein- stellung heftige We- hen mit reichlichem Wasserabfluss. Mut- termund und Cervix etwa zwei Finger hindurchlassend. Die Einleitung der künstl. Frühgeburt bei dieser Schwanger- schaft war ohne Er- folg geblieben.	Amput. unterhalb mehrerer in d. rech- ten Wand der Cervix sitzender Myome, von denen das eine auf- fallend hart und mit dem Peritoneum stark verwachsen war; trichterförmige Ex- cision des Cervikal- kanals und Etagen- naht des ganzen Stumpfes mit fort- laufenden Calgutnä- hen. Das Peritoneum	Hei- lung. nach lange fortge- setzten Schul- ze- schen Schwlg.	Lebend nach 26. Tage die An- lange stalt. Die Cervix gut zurückgebil- det, steht etwas nach links, rech- ten neben ihr ein har- ter, nicht sicher zu umgrenzender Tumor.

Name des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- vielte (Geburt).	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund. Blasen- sprung. Allgemeinbefinden	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Spencer Wells, op. (Brit. med. Journ. Oct. 1887). 12.			faustgrosses Convolut von Myomen beim vorliegenden Kopfb. den Beckeneingang von rechts herüber. Relative Indication.		wird darüber vernäht und noch einige tiefe Seidennähte durch den Stumpf gelegt, da es ziemlich stark in d. Scheide geblutet hatte. Verseukung d. Stiels. Dauer d. Ope- ration: 1 ³ / ₄ h. Porro.	Hei- lebend.	
Ullmann, op. (Två Kejsar- snitt utöfda på Göteborgs baru-bördshs. Hygiea Bd. 51. 1889, No. 12, p. 729). 13.	39 J.		Mehrere subseröse Myome, das grösste gänseegross + Kys- toma intralg. ovar dxt., das aber erst am Anfang der recht- zeitigen Geburt ent- deckt wurde.	Der Muttermund öff- nete sich trotz mehr- tägiger Geburtsarbeit nicht.	Laparotomie. Aus- schälung der grossen völlig subserös ent- wickelten Eierstock- cyste. Der Uterus wurde, da sich eine ganze Menge kleiner Myomknoten vorfand, amputiert. Ex- traperitoneale Me- thode.	+ 61 Tge. p. o. Ileus.	Wochenbett zu- erst gut. In de- 4. Woche rechts- seitige Lungen- entzündung. Nach Besserung letzte- rer: Albuminurie und Fieber. Kräf- teverfall mit Zei- chen v. behinder- ter Passage im Darm.
Black, op. (Med. news 1889. Nov. 2. p. 480). 14.	Rachi- tische Zwer- gin.		Uterus mit Fibroiden besetzt. Im rechten breiten Mutterband fand sich bei der Ope- ration eine grössere	Conj. ver. etwa 3 cm. Beckeneingang für etwa 2 Finger durch- gängig.	Beim Einschnitt in den mit Fibroiden besetzten Uterus rie- sige Blutung. Ab-	+ 3 Tage p. o.	

Prior, op. 27. 10.1889 (New-York). (A case. of Porros Oper. Amer. J. of obst., New-York 1890. 23. 523. 15.	42 1 p.	kleinere von d. Grösse eines Hühnercis. 2 faustgrosses Fibroid der Cervix.	Fieber u. übelriechen-der Ausfluss, Gelbsucht, Auftreibung u. Schmerzhaftigkeit d. Abdomens.	nach Entfernung der Frucht. Reichl. Fibringerin-sel auf dem Uterus. Därme verklebt. In der Schnittlinie am Uterus 2 interstitielle Fibroidknoten, die sich weit aus ihrer Kapsel hervordrängen, so dass die Vereinigung der Wundflächen unmöglich. Uterusinhalt zersetzt. Der enorme Stumpf wurde mit d. Draht-ecraseur versichert. Bauchhöhle mit Bor-säurelösung ausge-waschen. Bauchdeck. um den Stumpf ver-einigt, sowie ein Glas-drain eingeführt. 6 h. später begann der Stumpf zu nassen, weswegen die Ecra-seurkette festergezo-gen und mittelst Pa-quein verschorft wurde. Extraperito-neale Methode.	† † 3 Tage totfaul p. o. Periton. sept.	Verlauf d. Puer-periums glatt. 2 mal leichte Tem-peratursteiger. in-folge d. Stauung
Sänger, op. (Der Ges. f. Geb. u. Gyn. zu Leipzig in der Stützung vom	34 J. 5 p.	Ein im unter. Uterin-segment sitzendes My-oma uteri, die Er-weiterung d. Cervix verhindernd. Letztere	Wasserabfluss ohne vorausgegang. deutl. Wehen. Geburt p. v. n. nur möglich mit grösster Gefährdung	Bauchschnitt. Her-auswälzen des Uterus. Provisorische Gum-miligatur. Einschnitt in die Vorderwand	Hei-lung. lebend. Schül-ter-lage.	

Name des Operateurs bezw. Befr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund, Blasen- sprung Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
16. 12. 1889 mitgeteilt von (Donat).			bleibt f. einen Finger durchgängig. Eine Fehlgeburt. Drei- mal durch Kunsthilfe von toten Kindern entbunden.	der Mutter u. mit Zer- stückelung d. Kindes. Letzteres aber lebens- frisch. Fehlen von Infektionserseign. seitens d. P. Das grosse Myom nicht reponier- bar, von der Scheide aus nicht entfernb. Wunsch eines leben- den Kindes.	des Uterus, der von zahlreichen Myomen durchsetzt ist. Ab- tragung desselben. Interperiton. Be- handlung d. äusserst umfänglichen, noch d. grössten Teil d. Cer- vix myom einschliess. Stumpfes durch Etageinnähte u. sym- periton. Decknaht (Seide). Toilette der Bauchhöhle u. des Douglas. Drainage desselben durch ein gekrümmtes u. mit Jodoformgaze locker ausgestopft Glas- rohr. Schluss d. Bauch- wunde bis zur Drain- öffnung.		von Secret wegen Aussetzens des sonst täglichen Verbandwechsels. Drain am 20. Tge. entfernt.
v. Ott (Peters- burg), op. (Arch. f. Gyn. 37. 1890).	30 J. 1 p.	9.	Multiplex, teils inter- stitielle, teils subse- röse Uterusmyome, von denen das eine von dem unteren Cer- vix teil ausgehend, subperitoneal entwik- kelt, m. d. Umgebung	In den letzten Tagen klagte P. über wehen- artige Schmerzen u. Kurzatmigkeit, wobei die Herzöne der Frucht immer un- deutlicher wurden. Die P. mit tief einge-	Ohne die Zeit mit Versuchen, den ver- wachsenen Tumor aus dem klein Becken hervorzuholen, zu ver- lieren, wurde der Ure- rus samt Alnexus amputiert, der Tumor	Hei- lebend. lung.	Die Heilung selbst verzögerte sich durch Bildung ei- nes Abscesses in den Bauchdecken und Ausflossung (2 Mon. p. o.) ei-

Biggar, op. 3 Fälle von Sec- tiones caesar- eae. New-York med. record. 38. 13. Sept. 27. 1890. p. 344).	43 3 p.	10 Pfl. schweres Fib- rom am unteren Teile des Uterus.	Geburtsdauer schon 22 Std.	Kaiserschnitt mit nachheriger Exstirpa- tion des Uterus nach Porro.	† Nach- blutung.	† abge- storb. 12 Pfd. schwer	Pat. starb infolge Nachblutung aus dem Stiel, der in einer Keith'schen Klammer befe- tigt war.	Gewehretzen mit daran sitzenden Knopfnäht. Nach 1 1/2 Jahren p. o. hatte die Rück- bildung des zu- rückgelassenen Fibromyoms sol- che Fortschritte gemacht, dass es kaum noch nach- gewiesen werden konnte.
Landau, op. 10. 11. 90. Samml. klin. Vortr., Neue Folge No. 26. 1891. Berl. kl. Wochenschr. 1890) No. 52. 19.	28 J. I p.	Retrocervicales u. re- trouterines Myom, wo- durch der Beckenein- gang vollständig ver- legt war. Multiple bis nussgrosse, intersti- tielle und subseröse Myome.	Porto nicht erreichbar Fruchtwasser völlig abgeflossen. Opera- tion am normalen Ende.	Öffnung der Bauch- höhle Hervorwälzen des Uterus. Wegen Multiplicität der Tu- moren Amputatio uteri sammt Ovarien. Der Stumpf wurde mit Etagnennähten versorgt. Intraperi- toneale Stielbehand- lung. Drainage der Bauchhöhle mit Jodo- formgaze, die vom Donglas'schen Raum	Hei- lung.	Leben- des Mäd- chen, 7 Pfd. schwer wohl und mun- ter.	Verlauf vollkom- men ungestört Wohlbefinden 10 Tage p. o. Höchste Temperatur 37,1° Entlassung 3 1/2 Wochen p. o.	

Name des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- vielte Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund. Blasen- sprung Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Jahreis, op. (Ein Fall von Sect. caes. nach Porro wi- gen multipler Myome mit glückl. Aus- gang f. Mutter und Kind. München.med. Woch. 21. 1891). 20.	40 J. I p.		2 subseröse, üb.kinds- faustgrosse Myome d. Corpus uteri. Die linke Halbte des Beckens in den oberen Parteen durch einen soliden irreponiblen Tumor ausgefüllt, der nach rechts herübertagend, das Promontor und die obere Hälfte des Os sacrum bedeckt.	Geburtsdauer schon 36 Stunden. Seit 24 h. Fruchtwasser abge- flossen.	zum untersten Wund- winkel der Bauch- wunde durchgeleitet wurde. Kaiserschn. Bei Her- vorwältung des mit den beiden diagnosti- zierten und eussordem noch vielen kleinen Myomen durchsetzten Uterus wurde der Stiel des von der hin- teren Uteruswand, tief im unteren Uteri- negnonat, ausgehenden subserösen Myoms ab- gerissen. Abtragung des Uterus. Intra- perit. Methode. Ex- stirpation des im Stiel abgerissenen Myoms. Schluss der Bauchhöhle. Dauer 2 ¹ / ₂ Stunden.	Hei- lung. Lebend gedeiht gut bei künstl. Ernähr ung, befand sich in Steiss- lage.	Vorzügliches Be- finden einige Ta- ge p. o. Höchste Temperatur 38. Entlassung 4 Wo- chen p. o.
Lesi, op. (Lesi, La 3. operat. del Porro. Rac- coglitor med., Forli 1891. p. 5-9; in Fron- mels Jahresb. 1891). 21.			Multiple Myom.			Hei- lung. lebend.	

Fremmel, I. v.
Nach Harris,
The Porro operation,
New-York, Journ. of
Gyn. April 1893
Ann. Gyn. and
Paediat, Philadelphia
1890/91,
p. 345.
22.

Black, op.
(Black, J. F.
Porro's Operat.
mother and
child saved.
Brit. M. J.
Lond. 1892.
Bd. II, pag. 128
cit. nach From-
mels Jahreshb.
1892.
Centralbl. für
Gyn. 1892, No.
49; Refer. aus
Med. record
1892. Juni 25.
23.

Fernandes G.
R. Amput. de
l'utér. plein et
des annexes.
Travail avan-
cé, proci-dence
35
2 p.

Multiple Uterus-fibro-
ide seit 6 Jahren.

Operation etwa 1 Wo-
che vor der erwarteten
Entbindung.

Porro.

Hei-
lung.

Leben-
des
Mäd-
chen
8 1/2 Pf.
schwer

Die Mutter erholt
sich rasch und
kann 8 Wochen
p. o. entlassen
werden, nachdem
sie schon 2 Wo-
chen vorher um-
hergegangen war.

?

12 Stunden vor der
Operation Blasen-
sprung.

Schnitt vom Nabel zur
Symphyse wird später
verlängert um 6—7
cm.

Hei-
lung.

+ Ab-
gestor-
ben.

Die Diagnose war
vorher nicht ge-
stellt.
Temperatur
37, 6—38.
Am 17. Tage Ent-

Name des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- vielte Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund. Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für		Bemerkungen.
						Mutter	Kind	
du cordon, pe- dicule interne Guérison. Con- férence faite à la Société des Sciences mé- dic. de Lis- bonne. séance du 13. Fevr. 1892. Referat in Frommels Jahresber. 1892). 24.					und der gravis Ute- rus sammt seinem Myom vorgewälzt; Lig. lat. beiderseits mit je 2 Klammern abgeklemmt, elast. Ligatur ums Collum. Typische Amputatio uteri 6--8 cm ober- halb der Ligaturstelle, nachdem die Ligg. lata mit fortlaufender Catgutnath abgebun- den. Ausätzen der Cervix mit starker Carbollösung, Ver- schorfung d. Schleim- haut und Vernähen des Uterusstumpfes in 3--4 Etagen mit Catgut und Ueber- kleiden des Stumpfes mit Serosa, Stumpf versenkt Bauchtoi- lette.			leerung eines Bauchdeckenabs- cesses. Fast alle Fäden eifern. Hei- lung 80 Tage p. o. Frau gesund ent- lassen.
Kaltenbach, op. III, 1892. (Referat von Voigt i. d.	32 J. 1 p.	Ausge- tragen.	Ueber kindskopfgros- ses, breitbasiges, har- tes, unbewegliches Myom der Cervix ist nicht erreichbar	Abfluss des Fruchtwassers ohne Wehen; am selben Tage die Operation. Die Portio ist nicht erreichbar	Operation nach Porro. Uterus sammt Tumor abgetragen. Extra- peritoneale Behand-	Hei- lung.	lebend 56 cm. 4720 gr.	2 Stunden p. o. lebensgefährliche Blutung per vagi- nam, die auf Tam-

Ursache der Blutung: Die Verletzung eines grösseren Gefässes durch die unterhalb der Ligatur durchgeführten Lanzennadeln.

Sonst glatter Verlauf, abgesehen von etwa 14 Tage anhaltenden, mit Temperatursteigerung bis 38,5 einhergehenden profusen Blutungen (Sublymatintoxikation?) 6 $\frac{1}{2}$ Wochen p. o. Entlassung als geheilt. Das Kind gedeiht ausgezeichnet.

Deutsches Referat nicht vorhanden.

?

Heilung.

Porro.

Myom des Uterus.

Wejaminow,
op. (Ref. A.
Fratkin.
Russ. med.
Litt. No. 6.
Beilage z. St.
Petersb. med.
Wochen. 1892.
Chirurgitsch-
eski westnik.
Juni 1892).
26.

N a m e des Operateurs bezw. Refr. Quelle.	Alter der Frauen Wie- viele Schw.	Oper. in welch. Monat der Schw.	Anatom. Beschaffen- heit des Tumors. Frühere Entbindung.	Geburtsdauer bis zur Operation. Muttermund. Blasen- sprung. Allgemeinbefinden.	Ausführung der Operation.	Resultat für Mutter Kind	Bemerkungen.
Robson, A. W. Majo, (Lancet, Lond., Bd. 1, pag 414. 8 II. 1893; SchmidtsJhrb. No 238. 1893). 27.			Multiple Myome des Uterus.		Porro.	Hei- lung.	Ausführlicher Be- richt in deutscher Sprache nicht vor- handen.
Mixter, S. J. op. (Boston med. and surg. Journ. 119. 19. p. 16 f. 1889. in SchmidtsJhrb. 1889. No. 221). 28.			Multiple Myome des Uterus.		Porro.	Hei- lung.	Deutsches Referat nicht vorhanden.
Cataliotti (Pa- lermo) [Hof- meier, D. med. Woch.-Juli. 1886].			Myom des Uterus.		Porro.	Hei- lung.	?
29. Fehling (Basel), op. 2 6. 1890. 8 Uhr morg. 30.	35 1 p.	Ausge- tragen.	Subserös., gestieltes, das kleine Becken ausfüllendes, 2 faust- grosses Fibromyom.	Wehenbeginn: 1. 6. 4 Uhr a. m. Operation vor dem Blasensprung.	Porro Sriel extrap. ersorgung.	Hei- lung.	Das Nähere: Krankeng. I. + Reifes Kind, in traute- rin abge-

Journal. London, Bd. I. pag. 581. 18. 3. 1893), op. 17 I. 1893.	36 J.	Myoma fundi uteri im Kleinbecken ein- geteilt.	Seit etwa 10 Stund. in partu. Puls 140. Ein Fibrom d. Fundus hatte diesen im Klein- becken festgehalten. Der Knickungswinkel sprang als ein mäch- tiges Septum in die Ω -förmige Uterus- höhle vor. Inpartu.	Bei der Amputatio uteri wurde aus dem am Ende der vorigen Rubrik genannten Grund Cervix und Fundus in die Liga- tur abgefasst.	† 4 h. p. o.	Erucht vorher abge- storb. †	ge- boren. †
31. Herman, G. E. New-York. J. Gynäc. a. Obst., Bd. 3, pag. 484—486. 32.	33 J. 1 p.	9.—10. Monat. Verschiedene grosse, teils subseröse, teils interstitielle Myome, meist an d. vorderen Wand des Uterus. Ein grösseres Myom, kindskopfgross, im rechtsseitigen untern Uterusabschnitt bis zum Cervix reichend. intraligamentär und von weicher Konsi- stenz, die Randzone auf dem Durchschnitt missfarben, das den Geburtskanal beein- trächtigte.		Der Schnitt traf meh- rere Myome. Intraperitoneal. Stiel- versorgung.	Hei- lung.	Kind as- phy- tisch, wird bald wieder- belebt.	Wochenbett bis auf 3 kleine Fie- bererhebungen. (Maximum: 38,4) normal.

Die Diagnose der Complication ist nur in 1 Fall von vorherhin nicht gestellt worden.

Die Punktion des Tumors vor der Operation wurde gemacht:

3 mal beim konserv. Kaiserschnitt (2 mal a vagina);

1 mal beim Porro (von den Bauchdecken),

teils zur Sicherung der Diagnose teils zur Herbeiführung einer Verkleinerung der oedematös durchtränkten (daher dunkel fluktuierenden) Geschwülste.

Als Durchschnittsalter der zur Operation Gelangten, ergibt sich ein Alter von etwa 36 Jahren (Minimum: 28 — Maximum: 46 Jahre.)

Was die Zahl der vorausgegangenen Geburten betrifft, so verhält es sich damit wie folgt:

A. Konserv. Kaiserschnitt.

7 I pp. = 58,3 %

1 II p. (Abort im 3. Monat

1 III p.

2 V p. (1 mal zuerst 3 normale
Geburten, dann Abort
im 3. Monat).

1 VI p. (5 Frühgeburten)

8 mal nichts angegeben.

} = 41,7 % Mpp.

B. Porro.

15 I pp. = 75 %

1 II p.

2 III p.

1 V p. (1 Abort und 3 künstlich ent-
bundene tote Kinder)

1 XVI p. (sämmtl. 15 Geburten ohne
Kunsthilfe)

} = 25 % Mpp.

13 mal nichts angegeben.

Demnach handelte es sich meist um die Operation älterer Erstgebärender.

Die Indikation gaben meist grosse, das Kleinbecken ganz oder grösstenteils ausfüllende, unbewegliche, irreponible,

weil entweder durch Adhaesionen im Becken fixierte oder darin fest eingekeilte, ungestielte oder meist mit kurzem und dickem Stiel der Gebärmutter anhaftende, besonders deren unteren Abschnitt (Cervixmyome) einnehmende, subseröse, bisweilen interstitielle (oder beides) Myome, meist derart localisiert, dass eine Geburt auf natürlichem Wege, selbst bei zerstückelter Frucht unmöglich war. Einige Male wurde auf Grund einer relativen Indication eingegriffen. Beim Porro kam meist noch die Mehrheit der Geschwülste, eventuell die Zersetzung des Uterusinhalts in Betracht.

Die *Conjugata vera* war in einigen Fällen nahezu = 0, so dass der Finger nicht ins Becken einzudringen vermochte, in einigen anderen Fällen blieb zwischen Symphyse und Tumor eine Passage von nur 4, bezw. 3 und 2 cm. frei. Weitere Raumverengerungen wurden herbeigeführt:

1 mal durch ein gleichzeitig allgemein verengtes Becken;

1 mal durch ein ausserdem vorhandenes intraligamentäres Ovarialkystom.

Die Operation war compliciert:

A. Beim Konservat. Kaiserschnitt.

1 mal mit Cystitis und Pyelonephritis;

1 mal mit Endometritis septica;

1 mal mit Pyelonephritis,

1 mal mit intensiver parenchymatöser Nephritis.

B. beim Porro.

1 mal mit allgemeiner Septis;

1 mal mit Peritonitis septica.

Als vergebliche Entbindungsversuche wurden der Operation vorausgeschickt:

1 mal künstliche Frühgeburt;

2 mal Zange (einmal + Probeincision).

Der Erfolg der Operation war folgender:

A. Beim konserv. Kaiserschnitt.

8 Heilungen = 40%

12 Todesfälle = 60%:

Cystitis und Pyelonephritis

(schon ante operationem vorhanden), 36 h. p. o.

Peritonitis septica (schon ante oper. vorhanden)

4 Tage p. o.

Ursache? 24 h. p. o.

Sepsis 3 Tage p. o.

Einige Stunden p. o (P. kreiste intra operat).

Ursache? 4 Tage p. o.

Pyelonephritis (schon a. o vorhanden) 1 d. p. o.

Autopsie: intensive parenchymat. Neph. 36 h. p. o.

Endometritis septica und Pyelonephritis, 5 d. p. o.

3 d. p. o. (Zustand der P. war vor der Operation schon bedenklich).

4 d. p. o. (Verfasser infolge nachträgl. Chloroformwirkung. Wahrscheinlich inf. Peritonitis.

B. Beim Porro

20 Heilungen = 60,6%

13 Todesfälle = 39,4%

Sepsis (schon a. o.) 3 d. p. o.

Septicämie 5 d. p. o.

?

Sepsis 60 h. p. o.

do. 2¹/₂ d. p. o.

Verblutungssollaps, 24 h p. o.

Peritonitis (schon a. o.) 3 d. p. o.

Selbstmord, 4 d. p. o.

Ileus 61 d. p. o.

Ursache? 3 Tage p. o.

Peritonitis septica, 3 Tage p. o.

Nachblutung.

Ursache? 4 h. p. o.

Die Gesamtmortalität der Kaiserschnitte bei Myomen des Uterus überhaupt, beträgt demnach nahezu 50%.

Die Zeit der Ausführung der Operation fiel in den weitaus meisten Fällen in die Zeit nach dem Blasensprung (Maximum: 24 h. nach demselben).

Die Früchte waren fast alle vollständig oder nahezu vollständig ausgetragen; indes:

4 mal Früchte des 7. Monats (3 lebend entwickelt);

1 mal Frucht des 8. Monats (lebend entwickelt).

Unter 18 Fällen, wo über das Schicksal der Kinder etwas angegeben ist, handelte es sich

A. Beim konserv. Kaiserschnitt
um 16 lebende und 2 tote Kinder

Mortalität: = 9⁰/₁₀.

B. Beim Porro in 29 Fällen
um 17 lebende und 12 tote Kinder.

Mortalität: = 41,4⁰/₁₀.

Mutter und Kind wurden gerettet

A. Beim konserv. Kaiserschnitt
in 18 Fällen 8 mal (= 44,4⁰/₁₀).

B. Beim Porro
in 29 Fällen 13 mal (= 45⁰/₁₀).

Mutter und Kind gingen zu Grunde:

A. Beim konserv. Kaiserschnitt
in 2 Fällen (= 11,1⁰/₁₀;

B. Beim Porro
in 8 Fällen (= 28,6⁰/₁₀).

Der Schnitt durch die Gebärmutter traf

1 mal die Placenta

6 mal Geschwülste (1 mal davon beim konservat. Kaiserschnitt; dadurch Schwierigkeit der Uterusnaht!)

Die Entfernung der Geschwulst beim konservativen Kaiserschnitt wurde

1 mal vorgenommen;

2 mal geplant; aber unterlassen

a, weil der Tumor intraligamentär,

b, weil intra operat. plötzlich Collaps erfolgte.

Die Castration beim konservativen Kaiserschnitt wurde auffallenderweise nur ein einziges Mal ausgeführt (Der Fall verlief gut, und nach kurzer Zeit war eine Verkleinerung der Geschwulst zu konstatieren).

Als Folge der Operation stellte sich in 1 Fall eine Diastase der Recti ein.

Was die Art der Stumpfversorgung beim Porro-Kaiserschnitt betrifft, so wurde unter 17 Fällen

8 mal die intraperitoneale,

9 mal die extraperitoneale Methode angewandt.

Erfolg der intraperitoneal behandelten Fälle:

8 Heilungen,

0 Todesfälle, Mortalität: 0%.

Erfolg der extraperitoneal behandelten Fälle

3 Heilungen,

6 Todesfälle:

a, infolge Sepsis 60 h. p. o. (Schwache Frau mit Zeichen der Athromatose. Temperaturerhöhung schon vor der Geburt!);

b, infolge Sepsis 2 $\frac{1}{2}$ d. p. o. (Die Eihöhle befand sich in Zersetzung);

c, infolge Peritonitis (die schon a. o. vorhanden war),

d, Verblutungscollaps (Loslösung einer Ligatur),

e, Selbstmord,

f, Ileus 61 Tage p. o. (Wochenbett zuerst gut).

Die Mortalität beträgt hier also 66,7%.

Von Besonderheiten ist zu erwähnen, dass einmal eine, nach Gussacrow so seltene totale Fettneurose des Tumors vorhanden war, ausserdem:

1 mal Nabelschnurvorfall,

1 mal Vorhandensein eines Ellbogens im Muttermund.

Die Schlussbetrachtung sämtlicher Tabellen ergibt folgendes:

Die Entfernung von Myomen in der Schwangerschaft von der Scheide aus nehme man ohne weiteres vor, wenn es sich um gut gestielte submucöse Polypen des Corpus oder Cervix uteri handelt; denn sehr oft sind sie die Ursachen heftiger Blutungen in graviditate, die zum spontanen Abort führen können. Die einfache Polypabtragung in graviditate von der Scheide aus ist höchst selten von Abort begleitet;

anders verhält es sich mit der Euncleation interstitieller Cervixmyome oder breit aufsitzender submucöser Corpusmyome von der Scheide aus. Dadurch wird die schwangere Gebärmutter mehr insultiert, als durch die einfache Polypabtragung, weswegen es eher zum Abort kommen wird. Infolge dessen verschiebe man diese Operation, wenn es angingig ist, auf das erwartete normale Ende der Schwangerschaft, wodurch es möglich wird ein lebendes Kind zu erzielen.

Treten in graviditate lebensgefährliche Störungen auf, und ergiebt die Untersuchung gut gestielte subseröse Myome, so empfiehlt es sich die Entfernung derselben von den Bauchdecken aus vorzunehmen (Mortalität: 18,87%). Die Gefahr des Eintritts der Geburt infolge dieses Eingriffs steigt, wenn auf diese Weise ungestielte, subseröse oder interstitielle, fixierte, cystisch erweichte oder intraligamentäre Geschwülste entfernt werden. Durch letzteren Umstand ist es zu erklären, dass nach der Tabelle der Prozentsatz der Fehl- und Frühgeburten nach Myomotomien so hoch ist (40%). Während nach Hofmeier (s. o.) bei Complicationen der Myome mit Gravidität überhaupt in 12% spontaner Abort erfolgt [nach Tolocznow, Wien. med. Presse X. 1869 — Winkel, Volkmanns Sammlung klinisch. Vortr. No. 90. — Nauss, D. i. Halle. 1872 — Sébilleau, Thèse. Paris 1873 beträgt der Abort im Mittel 22%], ist in den Fällen, die ich in Tabelle I. angeführt habe und bei denen nach erfolgter Entbindung oder im Wochenbett eine Entfernung der Geschwulst von der Scheide aus vorgenommen wurde, der Abort in 38,46% eingetreten. Demnach wäre die Gefahr des Eintritts des spontanen Aborts infolge einfacher Laparomyotomie nicht wesentlich erhöht. Durch letztere Operation ist die Frau ein für allemal von ihrem Myom befreit, und wenn auch Abort eintritt infolge des operativen Eingriffes, so ist doch die Möglichkeit der späteren Geburt eines lebenden, ausgetragenen Kindes gegeben.

Wie für den konservativen Kaiserschnitt und den nach Porro die Indication dieselbe ist, und nur das Verhalten

der Geschwülste für die eine oder andere Art dieser beiden Operationsmethoden entscheidet, so verhält es sich auch mit der einfachen Laparomyotomie und der Amputatio uteri supravaginalis. Findet sich nach Eröffnung des Abdomens die Gebärmutter mit mehreren Myomen behaftet, die teils gestielt, teils ungestielt oder teils subserös, teils interstitiell sind, treten bei Ausführung der einfachen Myotomie unstillbare Blutungen aus dem Geschwulstbett auf, oder ist die Entfernung einer Geschwulst ohne Eröffnung des Cavum uteri oder aus anderen Gründen (intraligamentär, retro-peritoneal) nicht möglich, so tritt, natürlich vorausgesetzt, dass wie bei der Indication der einfachen Myotomie die Störungen wirklich ernst zu nehmen sind, die Amputation des schwangeren, myomatösen Uterus in ihre Rechte. Die Mortalität, die ohne Schwangerschaft nach Pozzi¹⁾ 21,6% beträgt, beläuft sich hier auf 26%, (bezw. 24,14%). Hauser²⁾ berichtet noch von einer Mortalität von 37,5% (auf 24 Fälle 9 mal der Exit. letalis). Besonders zu beachten ist, dass die Fälle, wo schon vor der Operation eine Complication vorhanden ist (meist Peritonitis), besonders durch diese Operation gefährdet sind. Auf die Erfolge der beiden Arten der Stumpfbehandlung werde ich weiter unten zu sprechen kommen.

In partu kommt, wenn die Myome ein unüberwindliches Hindernis für den vorantretenden Teil abgeben und die Frucht selbst zerstückelt die Geburtswege nicht zu passiren vermag, der Kaiserschnitt oder, falls dies möglich ist, die Entfernung der Geschwulst von der Scheide aus in Betracht. Handelt es sich in letzterem Falle um die Abtragung eines Polypen, so wird man sich nicht lange besinnen bei der günstigen Prognose (0% Mortalität), die diese Operation hat. Ist aber eine Enucleation zu machen, so bedenke man, dass hier die Mortalität eine grössere ist, als beim Porro (40% und 39,4%). Hier mache man besser, wie ich schon

1) Gaz. méd. de Paris 1890. No. 21. p. 241.

2) Arch. f. Gyn. 1891. Bd. 41.

oben erwähnte, falls man den Fall frühzeitig genug bekommt, die Enucleation am normalen Ende der Schwangerschaft. Erweist sich ein zur Kolpomyomotomie sonst geeignetes Myom zu gross für diese, so kann man ja so viel von demselben enucleiren, bis man die Möglichkeit des Vorbeitritts des vorangehenden Teiles annehmen kann, hat aber zu bedenken, dass die Gefahr der Verjauchung der übrig gebliebenen Geschwulstmassen oder falls der Rest post partum entfernt wurde, die Gefahr der Verjauchung des Geschwulstbettes sehr nahe liegt. Uebrigens ist die Enucleation post partum doppelt so günstig als die Polypabtragung (Mortalität 12,5% und 37,5%) wegen Gefahr des Eintritts von Gangrän und Jauchung des Stumpfes des Polypen.

Handelt es sich um nur vom Abdomen aus entfernbare Geschwülste, so wird man am besten mit dem konservativen Kaiserschnitt sehr sparsam verfahren. Eine Mortalität von 60% ist nicht gerade verlockend. Allerdings ist die Aussicht ein lebendes Kind zu erhalten beim „erhaltenden“ Kaiserschnitt (9% Mortalität) eine grössere als beim Porro (41,4% Mortalität). Das Gesamtergebnis der Porrooperation beträgt nach Harris¹⁾ 23,9%, während, wie wir schon gehört haben, der Porro-Kaiserschnitt bei complicierendem Myom eine Mortalität von 39,4% hat. Der konservative Kaiserschnitt fällt besonders dann sehr ungünstig aus, wenn Myome durch den Uterusschnitt getroffen werden. Natürlich schwindet bei beiden Arten des Kaiserschnitts die Aussicht auf Erfolg der Operation, wenn vor derselben schon eine Complication vorhanden war (Häufigkeit der Pyelonephritis). Nicht zu übersehen ist, dass die heutzutage sehr verbesserte Technik beider Arten des Kaiserschnittes viel günstigere Erfolge gezeitigt haben. So beträgt nach Apfelstedt²⁾ die Mortalität von 12 Fällen von Kaiserschnitten wegen Myomen

1) Rob. P. Harris, The Porrooperat. New-York. Journ. of Gyn. Apr. 1893.

2) Arch. f. Gyn. Bd. 48. 1894.

nach Sanger vom Jahre 1886—1893 nur 50⁰/₀, beim Porro nur 20⁰/₀ (unter 15 Fallen vom Jahre 1886—1893 nur 3 Todesfalle; letztere samtlich bei extraperitonealer Stumpfbehandlung).

Die Mortalitat von 66,7⁰/₀ bei extraperitonealer Stielbehandlung gegenuber einer solchen von 0⁰/₀ bei der intraperitonealen scheint zu Gunsten der letzteren Methode zu sprechen. Allein die Todesfalle bei der extraperitonealen Methode waren in den weitaus meisten Fallen die Folge ubler Zufalle wie z. B. schon vor der Operation vorhandene Sepsis bezw. Peritonitis; Loslosung einer Klammer infolge dessen Verblutung; ferner Selbstmord, Zufalle, die sich ebenso gut beim intraperitonealen Verfahren hatten ereignen konnen. Und warum ist das Verhaltnis bei den Fallen der Amputation ein umgekehrtes, indem namlich hier auf die intraperitoneale Methode 28,57⁰/₀ und auf die extraperitoneale nur 23,81 (bezw. 21,74⁰/₀) Mortalitat kommt, obwohl die Technik hier wie dort dieselbe ist? Die Differenz in der Mortalitat der beiden Methoden ist allerdings! beim Porro eine ganz frappante — 0⁰/₀ Mortalitat und 66,66⁰/₀! Man bedenke aber, dass unter den 16 Fallen des Porro, wo uber die Art der Stumpfbehandlung sich keine Angaben finden, 9 Falle von Heilerfolgen sind, von denen sicherlich der eine oder der andere extraperitoneal behandelt worden ist, wahrend in den ubrigbleibenden 7 Fallen der Exitus letalis eintrat, und in diesen wohl auch einmal der Stumpf intraperitoneal versorgt worden sein durfte. Die Frage, ob die intraperitoneale Methode den Vorzug vor der extraperitonealen verdient, ist heute noch eine offene: die erstere ist meiner Ansicht nach die beste in der Hand dessen, der sie vorzuglich ubt. Zwingen dann aber besondere Grunde (Verjauchung, Erweichung, eitrige Peritonitis oder sonstige Infektionsgefahr (s. Gusserow l. c.) zu einem extraperitonealen Verfahren, so ist ein eventl. ungunstiger Erfolg leicht zu erklaren.

Im Wochenbett geben Verjauchungen der Geschwulste sowie Blutungen oft die Indication zum Eingreifen. Polyp-

abtragungen von der Vagina, aus geben sehr günstige Resultate. Zeitlich getrennte Manipulationen in letzteren Fällen scheinen von Erfolg begleitet zu sein — erst Ligatur des Stiels der Geschwulst; späterhin Abschneiden desselben, falls nicht eine dissecierende Gangrän die Spontanausstossung der submucösen Polypen veranlasst. Die Enucleation hat eine Mortalität von 37,50/o, die meist durch entstehende Infection bedingt wird. Die Heilung tritt bei einer in puerperio vorgenommenen Enucleation von der Scheide aus eher ein, wenn sie nicht vor dem 10. Tage des Wochenbetts ausgeführt wird, weil dann die Gefahr einer Sepsis eine geringere ist.

Laparomyotomien mit und ohne Zurücklassung des Uterus nach der Geburt habe ich nicht berücksichtigt, weil diese meist so spät nach der stattgehabten Geburt ausgeführt wurden, dass von einem eigentlichen Puerperium nicht mehr gesprochen werden kann.

Zum Schlusse erfülle ich mit Freuden die angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Fehling für die gütige Erlaubniss der Veröffentlichung der 3 Fälle sowie für die vielfachen Ratschläge bei der Ausarbeitung der Dissertation an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank zu sagen; ebenso fühle ich mich Herrn Prof. Dr. v. Herff zum Danke verpflichtet für einige Litteraturangaben.

Lebenslauf.

Ich, Franz Sali Kirchheimer, katholisch, wurde geboren am 11. Oktober 1871 als der Sohn des schon im Jahre 1878 verstorbenen Grosskaufmanns und Brauereibesitzers zu Heilbronn am Neckar im Königreich Württemberg. Ich besuchte die Elementarschule, sowie die humanistische Abteilung des K. Karlsruhgymnasiums meiner Vaterstadt. Herbst 1890 verliess ich die letztere mit dem Zeugnis der Reife ausgestattet, um mich dem Studium der Medizin zu widmen. Zu diesem Behufe bezog ich zunächst die badische Landesuniversität Freiburg im Breisgau, wo ich das erste Semester im 5. bad. Inf.-Reg. No. 113 diente und im Anfang des 5. Semesters mich der medizinischen Vorprüfung mit Erfolg unterzog. Im 5. und 6. Semester lag ich in Marburg und im 7. Semester in Berlin medizinischen Studien ob. Von Berlin aus begab ich mich nach Halle, um hier meine Studien fortzusetzen. Das examen rigorosum bestand ich am 29. Januar 1895.

Ich besuchte die Kollege, Kurse und Kliniken folgender Herren Professoren:

in Freiburg

Baumann, Hildebrand, Keibel, v. Kries, Oppel, Riese, Warburg, Weissmann, Wiedersheim;

in Marburg

Ahlfeld, v. Büngner, C. Fränkel, Küster, Mannkopff, Marchand, H. Meyer, Müller;

in Berlin

Burchardt, Gerhardt, Gusserow, A. Martin, Oppenheim, Schoeler, J. Wolff;

in Halle

Ackermann, v. Bramann, Fehling, Harnack, v. Hippel, Hitzig, v. Mering, Pott, Weber.

Allen diesen meinen hochverehrten Lehrern sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt!